



9129 - 2016

Септолете тотал таблетки для рассасывания  
Текст листка-вкладыша

Листок-вкладыш  
Информация для потребителей

**СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ**

Таблетки для рассасывания 3 мг/1 мг  
Бензидамина гидрохлорид / Цетилпиридиния хлорид

**Торговое название**

Септолете® тотал  
Septolete® total

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от « 27 » 10. 2016 г. № 1043

КАС № 9 от 05.10.2016г

**Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства. Код АТХ: R02AA20.  
МНН: отсутствует.

**Лекарственная форма**

Таблетки для рассасывания

**Состав**

1 таблетка для рассасывания содержит

*Активные вещества:* 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида (в форме моногидрата).

*Вспомогательные вещества:* эвкалиптовое масло, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота безводная (E330), изомальтит (E953), бриллиантовый голубой (E133).

**Описание**

Круглые таблетки для рассасывания со скошенными краями и шероховатой поверхностью, от светло-голубого до синего цвета. Допускается наличие участков белого цвета, неравномерного окрашивания, пузырьков воздуха в массе таблетки и небольших зазубренных краев.

**Фармакологические свойства**

Септолете тотал оказывает противовоспалительное, обезболивающее и антисептическое действие.

Препарат предназначен для дезинфекции полости рта и уменьшения признаков воспалительного процесса.

**Показания к применению**

Местное лечение в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (тонзиллит, фарингит, стоматит, гингивит).

**Способ применения и дозы 9129 - 2016**
**Дозировка**

*Дети в возрасте от 6 до 12 лет:* рекомендуемая доза составляет 3 таблетки в день.

В данной возрастной группе лекарственное средство рекомендовано применять после консультации врача.

Препарат противопоказан детям младше 6 лет.

*Дети в возрасте от 12 лет и старше:* рекомендуемая доза составляет 3 - 4 таблетки в день.

*Взрослые:* рекомендуемая доза составляет 3 - 4 таблетки в день.

*Пациенты пожилого возраста*

Коррекции доз не требуется.

Не следует превышать рекомендуемые дозы. Не принимайте двойную дозу препарата с целью компенсировать пропущенный прием.

**Способ применения**

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3 – 6 часов.

Для достижения оптимального эффекта не следует применять препарат непосредственно до или сразу после чистки зубов.

**Курс лечения**

Препарат не следует применять в течение более 7 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния (или в случае его ухудшения) после 3 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата.

Препарат противопоказан детям младше 6 лет.

**Особые указания по применению лекарственного средства**

Препарат не следует принимать более 7 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния после 3 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

Лекарственные формы для местного применения могут вызывать реакции гиперчувствительности, особенно при длительной терапии. В таком случае рекомендуется прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Препарат не следует применять одновременно с анионными соединениями (например, присутствуют в зубной пасте). Соответственно, не рекомендовано применение препарата непосредственно до или после чистки зубов.

Препарат содержит изомальтит (E953). Пациентам, имеющим редкую врожденную непереносимость фруктозы, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Применение у детей**

Препарат противопоказан детям младше 6 лет.



9129 - 2016

У детей в возрасте от 6 до 12 лет лекарственное средство следует применять после консультации врача.

#### *Прием с пищей и напитками*

Не рекомендуется запивать таблетки молоком, так как возможно ухудшение их действия.

Не принимайте Септолете тотал непосредственно перед едой или во время приема пищи. Не следует принимать пищу или употреблять жидкость как минимум в течение одного часа после приема препарата.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

Не рекомендовано одновременное применение с препаратами из группы антисептиков.

#### **Беременность и период лактации**

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, перед приемом каких-либо препаратов Вам следует проконсультироваться с врачом.

Применение во время беременности не рекомендуется.

При назначении лекарственного средства женщине, кормящей грудью, врач оценит целесообразность прекращения грудного вскармливания с учетом его преимуществ для ребенка и ожидаемой пользы терапии для матери.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**

Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

#### **Передозировка**

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует немедленно сообщить об этом специалисту.

#### **Побочное действие**

Подобно всем лекарственным средствам Септолете тотал в отдельных случаях может вызывать нежелательные явления.

В *редких* случаях (1 из 1 000) возможны:

- реакции гиперчувствительности,
- крапивница, повышение чувствительности кожи к солнечному свету,
- бронхоспазм.

В *очень редких* случаях (1 из 10 000) возможны:

- локальное раздражение слизистой оболочки полости рта, легкое ощущение жжения в полости рта.

В случаях, для которых *частота не известна* (не может быть установлена на основе имеющихся данных), возможны:



9129 - 2016

- чувство жжения или онемения (потеря чувствительности) слизистой оболочки полости рта.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Следуя рекомендациям по применению, представленным в данном листке-вкладыше, Вы снижаете риск возникновения побочных реакций.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от света.

Не требует особых температурных условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

Срок годности – 2 года.

Не использовать позднее даты, указанной на упаковке.

Окончание срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача

### **Упаковка**

Блистеры по 8 таблеток из ПВХ/ПЭ/ПВДХ пленки и алюминиевой фольги: 8, 16, 24 или 32 таблетки для рассасывания в коробке, с листком вкладышем.

### **Производитель**

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.