

## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

### КАМФОРНОЕ МАСЛО

**Торговое название:** Камфорное масло.

**Форма выпуска:** раствор масляный для наружного применения 100 мг/мл.

**Описание:** прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

**Состав:** действующее вещество: камфора рацемическая - 3 г; вспомогательное вещество: масло подсолнечное - до 30 мл.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах.

Код АТХ: М02АХ10.

#### **Фармакологические свойства**

##### ***Фармакодинамика***


Лекарственное средство оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие.

##### ***Фармакокинетика***

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

## **Показания к применению**

Симптоматическое лечение мышечно-суставных болей, профилактика пролежней.



## **Способ применения и дозы**

Наружно. Наносят на болезненные участки 2-3 раза в сутки. Для профилактики образования пролежней обрабатывают участок кожи 2-3 раза в сутки. При нанесении раствора следует избегать травмирующих кожу движений.

Не рекомендовано применять более 7 дней.

Длительность лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

## **Побочное действие**

Аллергические кожные реакции (крапивница); раздражение кожи; головная боль, головокружение.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, склонность к судорожным реакциям, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема), беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет.

## **Применение в период беременности и лактации**

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Применение при беременности и лактации противопоказано. Не наносить на кожу молочной железы во время кормления грудью.

## **Применение у детей**

Лекарственное средство противопоказано применять у детей до 18 лет в связи с отсутствием адекватных данных.

**Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами**

Влияние лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами не изучалось. Рекомендовано соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с опасными механизмами.

### **Меры предосторожности**

Только для наружного применения.

Перед применением нанесите лекарственное средство на небольшой участок кожи.

Обработка больших поверхностей тела запрещается. Лекарственное средство можно применять только на чистой неповрежденной коже. При нанесении лекарственного средства на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение лекарственного средства и немедленно обратиться к врачу.

Не наносите лекарственное средство на открытые раны, в области глаз, на слизистые оболочки. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза смыть большим количеством воды.


Руки после применения раствора необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. После нанесения лекарственного средства не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения лекарственного средства.


Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, прекратите применение лекарственного средства и обратитесь к врачу.

Избегайте вдыхания. Храните в недоступном для детей месте.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. Не рекомендовано применять одновременно с другими средствами для наружного применения.





## **Передозировка**

Случаи передозировки при наружном применении не зафиксированы.

В случае приема камфорного масла внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

При случайном приеме лекарственного средства внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма, который у детей младшего возраста может привести к летальному исходу.

## **Упаковка**

По 30 мл во флаконах. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем в пачке.

## **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре от 10°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

## **Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612.