


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

### Фурацилин

**Торговое название:** Фурацилин.

**Международное непатентованное название:** Нитрофура́л (Nitrofurál).

**Форма выпуска:** мазь для наружного применения 2 мг/г.

**Описание:** мазь желтого цвета.

**Состав:** 25 г мази содержит: *действующего вещества* – нитрофура́ла (нитрофуразона) – 0,05 г; *вспомогательное вещество* – парафин мягкий белый.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептики и дезинфицирующие лекарственные средства. Производные нитрофурана.

Код АТХ: D08AF01.

#### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.* (в т.ч. *Salmonella paratyphi*). Обладает отличным от других химиотерапевтических средств механизмом действия: микробные флавопротеины восстанавливают 5-нитрогруппу, образуя высокореактивные аминопроизводные изменяют конформацию белков, в том числе рибосомальных, и других макромолекул, вызывая гибель клеток. Распространенность приобретенной резистентности в от-

ношении отдельных видов бактерий может варьировать в зависимости от времени и географического положения.

### **Фармакокинетика**

При нанесении на большие участки кожи может ~~попадать в системный~~ кровоток. Легко проходит через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основным путём превращения в организме является восстановление нитрогруппы. Выделяется почками и частично с желчью в просвет кишечника.

### **Показания к применению**

Гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, обморожения II-III степени, мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

### **Способ применения и дозы**

Для лечения ожогов и обморожений II-III ст., поверхностных ран кожи мазь наносят тонким слоем 1-3 раза в день в течение 2-3 дней.

Возможно применение под марлевые повязки.

Необходимо учитывать официальные рекомендации по соответствующему назначению и использованию антибактериальных препаратов.

### **Побочное действие**

*Возможно:* местные аллергические реакции, дерматиты.

### **Противопоказания**


Аллергические дерматозы, кровотечение, повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим производным нитрофурана.

### **Меры предосторожности**

При назначении беременным женщинам, женщинам в период лактации и детям рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного средства.

*Применение в период беременности и кормления грудью*

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не доказана.



### *Дети.*

Данные об эффективности и безопасности применения у детей отсутствуют. Не рекомендуется применение лекарственного средства у младенцев и детей раннего возраста.

*Влияние на способность управления транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.*

Не наблюдалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Негативные взаимодействия с другими лекарственными средствами не описаны.

### **Передозировка**

Не выявлена.

### **Упаковка**

По 25 г в тубах алюминиевых. Каждая туба вместе с листком-вкладышем в пачке.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64, тел/факс +375(177)735612.

