

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для специалистов)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**ЦИНКОВАЯ МАЗЬ**

**Торговое название:** Цинковая мазь.

**Международное непатентованное название:** -

**Форма выпуска:** мазь для наружного применения 100 мг/г.

**Описание:** мазь белого или светло-желтого цвета.

**Состав:** одна туба (25 г) содержит: *действующего вещества* – цинка оксида – 2,5 г; *вспомогательные вещества:* парафин мягкий белый.

**Фармакотерапевтическая группа:** смягчающие и защитные средства. Средства на основе цинка.

Код АТХ: D02AB.

***Фармакологические свойства***

***Фармакодинамика***

Цинковая мазь оказывает вяжущее, адсорбирующее, антисептическое действие, уменьшает выраженность экссудативных процессов.

При местном применении уменьшает проявления воспаления и раздражения кожи, смягчает и подсушивает ее.

***Фармакокинетика***


При наружном применении компоненты цинковой мази практически не абсорбируются в системный кровоток и не проявляют резорбтивного действия.

**Показания к применению**

- лечение и профилактика пеленочного дерматита;
- лечение дерматитов, экземы, опрелостей;

- лечение повреждений кожи (небольшие термические и солнечные ожоги, порезы, царапины).

### **Противопоказания**



Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и прилегающих тканей.

### **Способ применения и дозы**

#### *Пеленочный дерматит у детей*

С целью профилактики мазь наносят на чистую и сухую кожу (под пеленки), особенно перед сном для предотвращения возникновения раздражения кожи из-за длительного контакта с мокрыми пеленками.

С лечебной целью мазь наносят на кожу тонким слоем 2 – 3 раза в сутки (при необходимости – во время каждой смены пеленок) при появлении первых признаков гиперемии (покраснения кожи), опрелости или незначительного раздражения кожи.

*Дерматиты, экзема, термические и солнечные ожоги, порезы, царапины, опрелости.*

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 3 – 4 раза в сутки.

Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

### **Меры предосторожности**

Мазь предназначена только для наружного применения. Не применять при гнойничковых заболеваниях кожи.

Мазь наносить только на неинфицированные участки кожи.

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. В случае попадания мази в глаза следует промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Если пеленочный дерматит у ребенка не исчезает в течение 7 дней от начала применения препарата, необходимо прекратить лечение и обратиться за повторной консультацией к врачу.

## **Передозировка**

При местном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в больших дозах могут возникать боли в желудке, тошнота, рвота, диарея, стимуляция центральной нервной системы и судороги. Лечение симптоматическое.

## **Побочное действие**

Реакции повышенной чувствительности к препарату, ~~включая зуд, гиперемию, сыпь, изменения в месте нанесения мази, шелушение, боль, крапивницу.~~ При длительном применении возможно раздражение кожи. При развитии побочных реакций рекомендуется прекратить применение мази.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## *Дети*

Препарат можно применять в педиатрической практике.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не отмечено лекарственного взаимодействия Цинковой мази с лекарственными средствами системного действия. Данные о взаимодействии Цинковой мази с другими топическими средствами отсутствуют; поэтому их одновременное применение не рекомендуется.

*Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с механизмами.*

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

## **Упаковка**

По 25 г в тубах алюминиевых, в упаковке №1. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

