

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для специалистов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА

Торговое название: Женьшень настойка.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Форма выпуска: настойка.

Состав: спиртовое извлечение из корней женьшеня 1:10. Содержит не менее 67 % этанола.

Описание: прозрачная жидкость желтоватого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующие средства.

Код АТХ: А13А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинсенозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витаминов и минералов. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует аппетит, стимулирует половую функцию.

Снижает содержание глюкозы в крови, активизирует деятельность надпочечников.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению

В комплексной терапии астенических состояний, сниженной умственной и физической работоспособности, эректильной дисфункции неврастенического генеза. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30–40 мин до еды.

Применяют по 15–20 капель настойки 2–3 раза в день в течение 30–40 дней. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

Особенности применения у пожилых пациентов: не изучены.

Особенности применения у лиц с нарушенной функцией почек: не изучены.

Особенности применения у лиц с нарушенной функцией печени: с осторожностью.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: боли в животе, тошнота, рвота, диарея, запор.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, тахикардия.

Со стороны центральной нервной системы: головная боль, нервозность, бессонница.

Прочие: аллергические реакции, носовое кровотечение, гипогликемия.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, артериальная гипертензия, тахикардия, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, алкоголизм, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога, бессонница, кровоточивость, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, цирроз печени, детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

Меры предосторожности

Не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Лекарственный препарат содержит не менее 67 об. % этанола, то есть 317,29–423,05 мг на разовую дозу (15–20 капель), что равно 8,04–10,72 мл пива, 3,35–4,47 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом.

Настойка противопоказана пациентам с заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет.

Если во время приема лекарственного средства в течение 2 недель симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Пациентам с сахарным диабетом перед приемом лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом, так как прием настойки женьшеня может привести к небольшому снижению уровня глюкозы в крови.

Применение во время беременности и в период лактации

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственное средство не рекомендовано для назначения детям и подросткам до 18 лет.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков. Проявляет антагонизм с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические лекарственные средства, антипсихотические средства, анксиолитики, седативные лекарственные средства).

Усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств.

Усиливает действие варфарина.

Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Соблюдать осторожность в случае необходимости одновременного приема с ингибиторами MAO.


Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта: необходимо избегать совместного приема лекарственных средств, вызывающих дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем (дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризеофульвин, производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол,

прокарбазин). Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Симптомы: повышение артериального давления, ~~бессонница.~~



В случае передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка.

Лечение: симптоматическое.

Упаковка

30 мл или 50 мл во флаконах из стекла. Один флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№1).

Хранение

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

Срок годности

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.