



Листок-вкладыш
Информация для потребителей



ПИКОВИТ®
Эмульсия для приема внутрь

Торговое название препарата
Пиковит® (Pikovit®)

Лекарственная форма
Эмульсия для приема внутрь

Общая характеристика

Описание

Густая, вязкая жидкость от светло-желтого до коричневатого-оранжевого цвета. Эмульсия имеет приятный запах и кислый вкус. Допускается разделение эмульсии на два слоя, исчезающее после встряхивания флакона.

Состав

5 мл (1 дозирующая ложка) эмульсии для приема внутрь содержит:

Активные компоненты:

Retinolum (ретинола пальмитат 1,7 млн. МЕ/г, витамин А)	900 МЕ
Cholecalciferolum (холекальциферол 1 млн. МЕ/г, витамин D ₃)	100 МЕ
Riboflavinum (рибофлавин-фосфат натрия, витамин В ₂)	1 мг
Pyridoxini chloridum (пиридоксина гидрохлорид, витамин В ₆)	0,6 мг
Thiamini chloridum (тиамина гидрохлорид, витамин В ₁)	1 мг
Cyanocobalaminum (цианокобаламин, витамин В ₁₂)	1 мкг
Acidum ascorbinicum (аскорбиновая кислота, витамин С)	50 мг
Nicotinamidum (никотинамид, витамин РР)	5 мг
D-Panthenol (декспантенол, Д-пантенол)	2 мг

Вспомогательные вещества: агар, трагакант, сахароза, жидкая глюкоза, ароматизатор апельсиновое масло, ароматизатор концентрат апельсина, ароматизатор концентрат грейпфрута, полисорбат 80, лимонная кислота моногидрат, краситель Пунцовый 4R (E124), натрия бензоат, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Поливитамины.
Код АТХ А11ВА.

Фармакологические свойства

Пиковит эмульсия для приема внутрь содержит комплекс витаминов.



Витамины являются важными факторами метаболических процессов в организме, необходимы для нормального роста и развития, для поддержания и укрепления здоровья.

Витамин А регулирует рост и созревание клеток детского организма, а также является компонентом антиоксидантной защиты, входит в структуру клеточных мембран, необходим для защитной функции кожи и слизистых оболочек, участвует в фотохимическом акте зрения, стимулирует реакции клеточного иммунитета.

Витамин D₃ играет важную роль в поддержании баланса кальция и фосфора в организме. При его недостатке уменьшается содержание кальция в костной ткани, развивается рахит.

Витамин B₁ обеспечивает обмен углеводов, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин B₂ способствует процессам регенерации тканей, в том числе клеток кожи.

Витамин B₆ принимает участие в регуляции белкового, углеводного и жирового обмена, участвует в образовании гемоглобина, а также гормонов щитовидной железы, способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен.

Витамин B₁₂ участвует в процессах кроветворения, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин С является главным витамином-антиоксидантом, участвует во всасывании железа из кишечника, регулирует обмен в соединительной ткани, нормализует проницаемость сосудов, активно участвует в обезвреживании токсинов. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.


Никотинамид активизирует метаболические процессы в тканях, улучшает течение процессов регенерации, участвует в синтезе стероидных гормонов.

Д-пантенол участвует в метаболизме белка, в синтезе жирных кислот и холестерина, продуцировании энергии, поддерживает рост бифидобактерий – важного компонента биоценоза кишечника.

Показания к применению

Пиковит эмульсия для приема внутрь предназначена для детей в качестве профилактического средства:

- при отсутствии аппетита;
- для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- при недостаточном физическом развитии (отставании в росте);
- в качестве витаминного препарата в ежедневном рационе питания, особенно в зимний и весенний периоды;
- при повышенной физической и нервно-психической нагрузке у детей школьного возраста;



- в комплексной терапии при применении антибиотиков.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Сахарный диабет.

Особые указания

Детям первого года жизни можно принимать препарат только по назначению или под наблюдением врача.

Возможное окрашивание мочи в желтый цвет совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

До начала одновременного приема других витаминов или витаминно-минеральных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Особые предостережения относительно вспомогательных веществ

5 мл (1 доза) эмульсии для приема внутрь содержат 3,3 г сахарозы и 0,7 г глюкозы. Препарат не подходит пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или дефицитом сахароза-изомальтозы.

Беременность и период лактации

Беременные женщины и кормящие матери должны принимать витамины по назначению врача. Дозы витаминов в эмульсии для приема внутрь Пиковит адаптированы для детей.

Воздействие на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

О влиянии препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не сообщалось.

Способ применения и дозы


Препарат принимается внутрь после еды. Перед употреблением эмульсию во флаконе следует хорошо взбалтывать.

Дети в возрасте от 1 до 3 лет: рекомендуется давать по 1 дозирующей или чайной ложке (5 мл) 2 раза в день.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 дозирующей или чайной ложке 3 раза в день.

Дети в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 дозирующей или чайной ложке 3 – 4 раза в день.

Эмульсию для приема внутрь можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре. При отсутствии аппетита препарат следует давать ежедневно в течение 1 месяца. Повторный курс приема через 1 – 3 месяца или по рекомендации врача.

**Побочное действие**

При приеме витаминов возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме **высоких доз** немедленно обратитесь к врачу.

Передозировка

При приеме препарата в рекомендованных дозах интоксикация не наблюдалась.

Длительный прием очень высоких доз витаминов может быть причиной гипервитаминоза А и D, хотя риск развития передозировки при приеме эмульсии для приема внутрь Пиковит минимален.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче).

Форма выпуска

Флаконы темного стекла по 150 мл эмульсии для приема внутрь.

1 флакон с полиэтиленовой крышкой с полиэтиленовым защитным кольцом первого вскрытия в картонной коробке в комплекте с дозирующей ложкой 5 мл.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Препарат следует использовать в течение 2 месяцев после открытия флакона.

Не использовать позднее даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Предприятие-производитель

КРКА, д.д., Ново место,

Шмарьешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения