

ИНСТРУКЦИЯ **СОГЛАСОВАНО**
 по медицинскому применению препарата
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
МУКАЛТИН
(MUCALTIM) от 18.08.2017 г. № 944

Общая характеристика:

Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-буроватого цвета вкраплениями, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

Состав на одну таблетку.

Действующее вещество: мукалтин, полученный из Алтея травы *Althaea officinalis* L. (8-12:1) – 50 мг, экстрагент - вода питьевая.

Вспомогательные вещества: кальция стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.

Форма выпуска. Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A.

Фармакологические свойства.**Фармакодинамика**

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного. Лекарственное средство обладает обволакивающими и отхаркивающими свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению. В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозировка.

Взрослым и детям от 12 лет внутрь 1 - 2 таблетки 2 - 3 раза в день перед едой. Курс лечения составляет в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочные эффекты. Возможно возникновение аллергических реакций (сыпь, крапивница, зуд кожи), диспепсических явлений.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

Передозировка. При длительном применении или превышении указанных доз могут возникнуть тошнота и рвота.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Целесообразно принимать разовые дозы лекарственного средства каждые 4 часа.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания,

появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.


Дети. Лекарственное средство не следует применять у детей до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами (например, содержащими кодеин) и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Условия и срок хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 4 года.

Условия отпуска. Без рецепта.



Упаковка.

По 10 таблеток в стрипе из бумаги ламинированной полиэтиленом. По 3 стрипа вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

По 30 таблеток в контейнер пластиковый с крышкой с контролем первого вскрытия. Свободное пространство в контейнере заполняют ватой медицинской гигроскопической. На контейнер наклеивают этикетку. По 1 контейнеру вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой с печатью, лакированной. По 3 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

Производитель. ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Дата последнего пересмотра.