


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

АКТОВИР

- *Перед использованием лекарственного средства Актовир Вы должны проконсультироваться с врачом.*
- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.*
- *Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

Торговое название: Актовир.

Международное непатентованное название: не имеет.

Форма выпуска: мазь для наружного и местного применения.

Описание: мазь от белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета до светло-желтого с коричневатым или зеленоватым оттенком цвета.

Состав: каждая туба содержит: *активные вещества:* ацикловира - 100 мг, бутаминафена - 40 мг; *вспомогательные вещества:* парафин жидкий, парафин твердый, вазелин.

Фармакотерапевтическая группа: Противовирусные препараты для наружного применения.

Код АТС: D06BB.

Фармакологическое действие

Актовир – комбинированный препарат, оказывающий противовирусное действие (противогерпетическое), которое обусловлено фармакологическими свойствами входящих в него активных компонентов: ацикловира и бутаминафена.

Ацикловир

Ацикловир является противовирусным лекарственным средством, в исследованиях *in vitro* продемонстрировавшим активность против вируса простого герпеса (Herpes Simplex) 1 и 2 типа. При попадании в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется и преобразуется в активную форму – ацикловира трифосфат. Первый этап этого процесса зависит от наличия HSV-кодированной тимидинкиназы. Ацикловира

трифосфат действует как ингибитор и субстрат для герпес-специфичной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.

Бутаминофен

Бутаминофен является антиоксидантом фенольной природы. Лекарственное средство обладает противовирусной активностью при лечении герпетических заболеваний кожи.

Механизм противовирусного действия бутаминофена изучен недостаточно.

В исследованиях на животных выявлен синергизм противовирусного действия входящих в состав препарата Актовир активных компонентов.

Показания к применению

Актовир применяют при герпетических поражениях кожи, вызванных вирусом Herpes Simplex, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.

Применение у пациентов с ослабленным иммунитетом

Пациентам с ослабленным иммунитетом применять не рекомендуется и следует проконсультироваться с врачом относительно лечения любой инфекции.

Способ применения и дозы

Мазь Актовир применяют наружно, наносят на пораженные участки 4-6 раз в сутки (как можно раньше после начала инфекции). Полоску мази длиной около 1 см следует наносить на 25 см² пораженной кожи или слизистой. Важно начинать лечение рецидивирующей инфекции во время продромальной фазы или в самом начале проявления инфекции. Длительность лечения – не менее 5 дней, максимум – 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней, следует обратиться к врачу.

Чтобы не допустить ухудшения состояния и предупредить передачу инфекции, необходимо мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем.

Применение у детей. В связи с отсутствием адекватных данных применение лекарственного средства у детей до 12 лет не рекомендовано.

Побочное действие

Побочные реакции указаны с использованием следующей системы классификации нежелательных эффектов по частоте: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$).

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто: проходящее жжение или покалывание после применения мази, сухость или шелушение кожи, зуд; редко: эритема, контактный дерматит в месте нанесения.

Со стороны иммунной системы: очень редко: реакции гиперчувствительности немедленного типа, в том числе отек Квинке и крапивница.

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, офтальмогерпес. С осторожностью применяют препарат при беременности и в период лактации.

Передозировка

Симптомы: головная боль, неврологические нарушения, одышка, тошнота, рвота, диарея, нарушение функции почек, летаргия, судороги, кома.


Лечение: промывание желудка, поддержание жизненно важных функций, гемодиализ.

Меры предосторожности

Для предупреждения аутоинокуляции вируса на другие участки кожи или слизистой необходимо использовать пальчики или резиновые перчатки.

Препарат Актовир не следует наносить на слизистые оболочки полости рта и глаз. Избегать случайного попадания в глаза.

Препарат Актовир эффективен для профилактики рецидивов герпеса губ. Эффективность лечения будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых признаках инфекции). Для



реализации лечебного эффекта имеет значение состояние иммунной системы, поэтому у пациентов со сниженным иммунитетом (при ВИЧ/СПИДе или после трансплантации костного мозга) на фоне местного применения мази Актовир следует назначать системное введение противогерпетических препаратов, также как в случае тяжелого и рецидивирующего течения герпетической инфекции.

При выраженных проявлениях герпеса губ рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Лицам, имеющим герпес на губах (особенно при наличии открытых поражений), необходимо строго соблюдать правила предосторожности, чтобы не допустить инфицирования других людей.

Актовир не предупреждает передачу герпеса половым путем, поэтому в период лечения необходимо воздерживаться от половых контактов, даже при отсутствии клинических проявлений инфекции.

Применение во время беременности и в период лактации. Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу. Применение показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При назначении ацикловира в формах для системного применения лекарственное средство проникает в грудное молоко. Назначение препарата в этот период возможно только после оценки соотношения риск/польза.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Исследования по изучению влияния лекарственного средства на скорость реакции не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если в настоящее время или в недавнем прошлом Вы принимали другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу.

При наружном применении взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.

Возможно одновременное применение препарата в составе комплексной терапии с бензилпенициллином (в виде натриевой и новокаиновой соли), кларитромицином, метронидазолом, галазолином, мазью цинковой, ацетилсалициловой кислотой, алоэ, витаминами В₁, В₆, С.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 4 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель:
РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

