


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**Аммиак**

**Торговое название:** Аммиак.

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Форма выпуска:** раствор для наружного применения 100 мг/мл.

**Описание:** прозрачная бесцветная летучая жидкость с характерным острым запахом аммиака.

**Состав:** одна ампула (1 мл) содержит: *действующего вещества* – аммиака раствора концентрированного – 0,44 мл; *вспомогательное вещество* – вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:** стимуляторы дыхания.

**Код АТХ:** R07AB.

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Аналептическое средство; оказывает стимулирующее действие на дыхательный центр – рефлекторно, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей (окончания тройничного нерва). Вдыхание паров аммиака в высоких концентрациях вызывает рефлекторную остановку дыхания. При местном нанесении на кожу - антисептическое действие. При длительном контакте раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки может переходить в прижигающее (коагуляция белков) с развитием гиперемии, отека и болезненности.

Быстро выводится с выдыхаемым воздухом.

### *Фармакокинетика*

Аммиак не попадает в системный кровоток, быстро выводится с выдыхаемым воздухом.

### **Показания к применению**

Аммиак используют в качестве средства скорой помощи для стимуляции дыхания и выведения больных из обморочного состояния.

Местно: в виде примочек при укусах насекомых.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к активному веществу. Для наружного применения - кожные заболевания (в т.ч. дерматит, экзема), детский возраст до 3 лет.

### **Способ применения и дозы**

Ингаляционно, местно. Для стимуляции дыхания и выведения пациентов из обморочного состояния – ингаляционно: осторожно подносят небольшой кусок ваты или марли, смоченной аммиаком, к носовым отверстиям (на расстояние 0,5 – 1 см).

При укусах насекомых применяют местно в виде примочек (длительность процедуры – до 30 секунд).

### **Побочное действие**

При вдыхании паров раствора аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания, гиперсаливация, першение в горле, гиперемия слизистой оболочки полости рта. При местном применении возможны раздражения, дерматиты, экземы в месте аппликации, аллергические реакции. При случайном проглатывании – ожог пищевода и желудка.

### **Передозировка**

Усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

### **Меры предосторожности**

При местном применении нанесение раствора аммиака возможно только на неповреждённую кожу.

Избегать попадания в глаза. При случайном поражении слизистой оболочки глаз – промывать глаза водой несколько раз (в течение 15 мин с перерывом 10 мин) или 3 % раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5 % раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приёма внутрь – пить воду, фруктовый сок, молоко, 0,5 % раствор лимонной кислоты или 1 % раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка. Особенно чувствительны к действию аммиака дети, поэтому следует соблюдать осторожность при использовании средства в данной возрастной категории, не применять у детей до 3 лет.

*Применение во время беременности или кормления грудью*

В период беременности и кормления грудью применение лекарственного средства возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и другие виды деятельности, связанные с необходимостью концентрации внимания:* не влияет.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может нанести вред Вашему здоровью.

*Не использовать у детей до 3-х лет, у детей старше 3-х использовать с осторожностью.*

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Не установлены.

**Упаковка**

По 1 мл в ампулах из стекла. 10 ампул вместе с ножом для вскрытия ампул и листком-вкладышем помещают в коробку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

