



**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для специалистов)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО**

**Торговое название:** Вазелиновое масло.

**Форма выпуска:** масло.

**Описание:** бесцветная, прозрачная маслянистая жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство.

**Код АТХ** А06АА01.

**Фармакологическое действие**

Слабительное средство. Размягчает каловые массы; оказывает слабое стимулирующее влияние на моторику кишечника. Слабительный эффект наступает через 6-8 ч.

*Фармакокинетика*

При приеме внутрь не всасывается.

**Показания к применению**

Внутрь – запоры у взрослых.

Наружно – перед проведением медицинских процедур для смазывания кончика клизмы, газоотводной трубки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к лекарственному средству, острые воспалительные процессы органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит), кишечная не-

проходимость, кишечное кровотечение, лихорадочный синдром, геморрой, беременность, период менструации, детский возраст до 18 лет.

Не применять при отравлении жирорастворимыми соединениями (фосфор, бензол и др.). Не применять внутрь одновременно с жирорастворимыми антигельминтными средствами.

#### **Способ применения и дозы**

Внутрь взрослым по 15-30 мл (1-2 столовые ложки) один раз в день через 2 ч после еды. Курс лечения – не более 5 дней.

#### **Передозировка**

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение симптоматическое.

#### **Побочное действие**

Длительное применение может вызвать нарушение процесса пищеварения, атонию кишечника, тошноту, анорексию, гиповитаминоз А, D, Е, К, раздражение и зуд в области заднего прохода. В отдельных случаях возможны аллергические реакции (гиперемия, зуд).

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Усиливает побочные эффекты жирорастворимых антигельминтных средств.

Не следует назначать лекарственное средство беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

В период кормления грудью применяют только по назначению врача с учетом соотношения польза для матери/риск для ребенка.

У детей может применяться только как наружное средство.

#### ***Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы***

Данные отсутствуют.

#### **Меры предосторожности**

Перед применением взбалтывают.

После прекращения курса приема внутрь вазелиновое масло может некоторое время выделяться из заднего прохода и загрязнять белье.

**Упаковка**

30 мл во флаконах из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Название и адрес изготовителя**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.