




**Инструкция по медицинскому применению  
для специалистов**

**РЕННИ® (RENNIE®)**

**Международное непатентованное название**  
Отсутствует

**Торговое название**  
Ренни



**Лекарственная форма**  
Таблетки жевательные с ментоловым вкусом.

**Описание**  
Белые или желтовато-белого цвета квадратные таблетки с вогнутыми поверхностями, гравировкой “RENNIE” с обеих сторон, с запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа**  
Прочие комбинации антацидных средств. Код АТС: А02АХ.

**Состав**  
Действующие вещества:  
кальция карбонат 680 мг;  
магния карбонат основной, тяжелый 80 мг.  
Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный прежелатинизированный, крахмал картофельный, тальк (Е553b), магния стеарат (Е572), парафин легкий жидкий, ментоловый ароматизатор (ментоловое масло, мальтодекстрин, аравийская камедь, кремния диоксид), лимонный ароматизатор (лимонное масло, мальтодекстрин, альфа-токоферол).

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*


Лекарственное средство содержит антацидные вещества: кальция карбонат и магния карбонат. Принцип действия местный, не зависит от поступления действующих веществ в системный кровоток. Кальция карбонат оказывает нейтрализующее действие. Данный эффект усиливается добавлением магния карбоната, который также имеет нейтрализующее действие.

*Фармакокинетика*

В результате взаимодействия Ренни с желудочным соком в желудке образуются растворимые соли кальция и магния.

Уровень абсорбции кальция и магния из этих соединений зависит от дозы препарата и индивидуальных особенностей. Максимальный уровень абсорбции – 10 % кальция и 15-20 % магния. У здоровых лиц небольшое количество абсорбированного кальция и магния выводится через почки. При нарушении функции почек уровень концентрации кальция и магния в плазме может возрастать. В кишечнике из растворимых солей образуются нерастворимые соединения, которые выводятся с калом.

2299 - 2016

**Показания для применения**

Применяется при изжоге и кислотном рефлюксе.

**Способ применения и дозы**

Взрослые и дети старше 12 лет: разовая доза 1-2 таблетки, при болях – от 4 до 8 таблеток в день. Таблетку можно разжевать или держать во рту до полного рассасывания.

При сильной боли доза может быть увеличена на короткое время до 11 таблеток в день.

Продолжительность приема лекарственного средства не должна превышать 10 дней.

**Побочные действия**

Перечисленные ниже побочные реакции препарата основаны на спонтанных сообщениях, поэтому расположение их с соответствующей категорией частоты не применимо.

*Со стороны иммунной системы:* очень редко аллергические реакции - высыпания, крапивница, отек Квинке и анафилаксия.

*Со стороны ЖКТ:* тошнота, рвота, расстройство желудка и понос.

*Со стороны обмена веществ и питания:* у пациентов с нарушением функции почек длительный прием больших доз препарата может привести к проявлению реакций, связанных с передозировкой - гипермагниемии, гиперкальциемии и алкалозу, что может спровоцировать возникновение симптомов со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, запор) и мышечную слабость.

*Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:* мышечная слабость.

*Со стороны нервной системы:* потеря вкуса, головная боль.

*Со стороны почек и мочевыводящих путей:* азотемия.

*Побочные реакции, связанные с молочно-щелочным синдромом:* астения и кальциноз.

**Противопоказания**

Нефрокальциноз, тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, гиперкальциурия, гипофосфатемия; наследственные заболевания, связанные с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы; повышенная чувствительность к ингредиентам препарата, миастения, кишечная непроходимость.

**Передозировка**

Преимущественно у пациентов с нарушением функции почек продолжительный прием больших доз препарата может привести к почечной недостаточности, гипермагниемии, гиперкальциемии и алкалозу. В таком случае следует прекратить прием препарата и принять достаточное количество жидкости. В тяжелых случаях передозировки (например, молочно-щелочной синдром) следует проконсультироваться с врачом, поскольку могут потребоваться дополнительные меры по восстановлению водного баланса.

Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности**

Пациентам рекомендуется обратиться к врачу при наличии одного или более из следующих симптомов: потеря веса; затрудненное глотание или постоянный дискомфорт в области желудка; нарушения пищеварения, которые появились впервые или изменились; наличие заболевания почек (данная информация необходима для мониторинга уровня кальция в сыворотке).

В связи с наличием сахарозы препарат противопоказан пациентам с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы и галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Если симптомы сохраняются после 10 дней лечения, или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом для проведения обследования и пересмотреть проводимое лечение.

Длительное использование препарата может увеличить риск образования камней в почках.

Препарат не следует использовать для лечения более 10 дней: побочные эффекты наблюдались при приеме в сочетании с тиазидными диуретиками или у пациентов, принимающих большие количества молока или молочных продуктов, особенно при длительном применении.

В случае приема более 4-8 таблеток в день необходимо ~~максимально~~ ограничить продолжительность лечения, после исчезновения симптомов прием лекарственного средства следует прекратить.

Указание больным сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 475 мг сахарозы.

2299 - 2016

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Антациды могут взаимодействовать с другими лекарственными средствами.

При одновременном приеме снижается всасывание в ЖКТ других лекарственных средств, принимаемых внутрь. В качестве меры предосторожности целесообразно принимать антациды отдельно от других лекарственных средств.

Рекомендуется принимать Ренни за 2 часа до или после приема других лекарственных средств: ацетилсалициловая кислота; антигистаминные H<sub>2</sub>; ателолол, метопролол, пропранолол; хлорохин; циклины; дифлунизал; дигоксин; дифосфонаты; фексофенадин; железо (соли); фторхинолоны; натрия фторид; глюкокортикоиды (описано для преднизолона и дексаметазона); индометацин; изониазид; лансопразол; линкозамиды; кайексалат; кетоконазол; нейролептики фенотиазинового ряда; пеницилламин; фосфаты; тироксин; стронций, сульпирид; соли цинка;

Соблюдать осторожность при приеме с тиазидными диуретиками.

Увеличивается почечная экскреция салицилатов за счет ощелачивания мочи.

### **Беременность и лактация**

Достоверные данные о тератогенезе у животных отсутствуют. При назначении в высоких дозах и длительном введении карбоната кальция было выявлено развитие аномалий в виде оссификаций. При назначении в рекомендуемых дозах людям данные о возникновении пороков развития или эмбриотоксических эффектов не обнаружены. Тем не менее, данные о случаях приема лекарственного средства беременными женщинами недостаточны для исключения возможного риска. Поэтому назначение препарата женщинам во время беременности может рассматриваться только в случае абсолютной необходимости.

При назначении лекарственного средства беременной женщине следует учитывать, что соли магния могут вызвать развитие диареи, при приеме солей кальция в высокой дозе в течение длительного времени существует риск гиперкальциемии с кальцинозом внутренних органов, в том числе почек.

В период грудного вскармливания назначение Ренни возможно при условии соблюдения рекомендаций по применению. При приеме необходимо соблюдать осторожность.

### **Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами**

Данные о влиянии на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами отсутствуют.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Указ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

### **Срок годности**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Форма выпуска**

По 12 таблеток в блистере (ПВХ/Ал) с перфорацией.


По 1 или 2 блистера с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Название фирмы заявителя /производителя, адрес**

Байер Консьюмер Кэр АГ,  
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария  
Дельфарм Гайар,  
33 Рю де Л'индустри, 74240 Гайар, Франция



НДРБ

2299 - 2016