

## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

### КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

**Торговое название:** Календулы настойка

**Форма выпуска:** настойка.

**Описание:** прозрачный раствор коричневого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

**Состав:** спиртовое извлечение из календулы цветков 1:10. Содержит не менее 67 % этанола.

**Фармакотерапевтическая группа:** лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний горла. Антисептические средства.

**Код АТХ:** R02AA.

#### Фармакологическое действие

Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках ноготков (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, эфирное масло, сесквитерпены, тритерпены, полисахариды), оказывают местное противовоспалительное, антисептическое и репаративное действие.

#### Показания к применению

Лекарственное средство применяется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и горла (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспали-

тельных процессов кожи и небольших поверхностей.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Детский возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла). Период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

При наружном применении и для полоскания горла 1 чайную ложку (около 140 капель) настойки календулы разводят в стакане теплой кипяченой воды. Приготовленный раствор применяют для полосканий горла и для наружного применения (повязки, аппликации).

Способ применения при заболеваниях кожи зависит от характера поражения и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции. В редких случаях – возникновение дерматита в месте аппликации.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Особые указания**

Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы.

Если после применения лекарственного средства в течение одной недели симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

#### *Применение в период беременности и кормления грудью*

В связи с отсутствием достаточных клинических данных не рекомендуется применять лекарственное средство в период беременности и кормления грудью.

#### *Применение у детей*

Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).

#### *Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами*

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При случайном приеме внутрь лекарственное средство влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства.

#### **Передозировка**

Возможно усиление побочных явлений.

Лечение: отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

#### **Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Негативные взаимодействия с другими лекарственными средствами не описаны.

#### **Упаковка**


50 мл во флаконе из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от огня.



**Срок годности**

2,5 года.

Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.