

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь	
от « <u>29</u> », <u>04</u> 20 <u>19</u> г. № <u>519</u>	Испр
КЛС № <u>3</u> от « <u>29</u> », <u>03</u> 20 <u>19</u> г.	Ипр

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### по применению лекарственного средства

Ипратропиум, раствор для ингаляций

(информация для пациентов)

*Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать прием препарата. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Это лекарство назначено лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

### СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Какая информация содержится в листке-вкладыше
2. Для чего ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций используется
3. Что надо знать перед применением лекарственного средства ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций
4. Как применять ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций
5. На что надо обращать внимание во время применения лекарственного средства
6. Нежелательные эффекты
7. После применения лекарственного средства
8. Описание лекарственного средства ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций

#### 1. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ЛИСТКЕ-ВКЛАДЫШЕ

Этот листок-вкладыш дает ответы на некоторые общие вопросы касательно лекарственного средства ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций. Он не содержит всей доступной информации. Информация, содержащаяся в листке-вкладыше, не заменяет консультацию врача или фармацевта. У всех лекарственных средств есть риски и преимущества. Ваш лечащий врач проанализировал риски применения ИПРАТРОПИУМа, раствора для ингаляций, по сравнению с преимуществами, которые Вы будете иметь, применяя данное лекарственное средство.

**Если у Вас есть какие-либо сомнения по применению лекарственного средства, обратитесь к Вашему доктору или фармацевту.**

**Храните листок-вкладыш вместе с лекарственным средством. Возможно, Вам потребуется прочесть его еще раз.**

#### 2. ДЛЯ ЧЕГО ИПРАТРОПИУМ, РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Ипратропиум, раствор для ингаляций используется для лечения:

- Астмы
- Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
- Людей, которые испытывают трудности с дыханием во время или после хирургического вмешательства, используя дополнительную вентиляцию

Астма - это состояние легких, когда ткань легких воспаляется (становится красной и набухает), что создает трудности при дыхании. Это может быть вызвано аллергией на домашних животных, пыль или другие раздражители.

Хроническая обструктивная болезнь легких – это состояние легких, которое может вызвать сложности при дыхании, одышку и постоянный кашель.

ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций содержит активное действующее вещество ипратропия бромид. Он относится к группе лекарственных средств, которые называются антихолинергическими бронходилататорами.

Ипратропиум, раствор для ингаляций открывает дыхательные пути у людей, страдающих астмой, хроническим бронхитом и трудностями с дыханием во время или после хирургического вмешательства.

Он начинает действовать немедленно после применения, максимальный эффект достигается через 2 часа после приема.

**Спросите Вашего врача, если у Вас есть вопросы, почему ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций был прописан Вам.**

Нет доказательств, что применение ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций вызывает привыкание.


ИПРАТРОПИУМ, раствор для ингаляций доступен только по рецепту врача.

### **3. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИПРАТРОПИУМ, РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ**

*Когда Вы не должны использовать лекарственное средство*

Не используйте Ипратропиум, раствор для ингаляций, если у Вас есть аллергия к:

- ипратропия бромиду
- аналогичным лекарственным средствам, которые содержат атропин или атропиноподобные вещества
- каким-либо ингредиентам, перечисленным в конце листка-вкладыша
- каким-либо другим антихолинергическим лекарственным препаратам



Некоторые из симптомов аллергических реакций могут включать:

- трудности с дыханием, хрипоту или нехватку дыхания
- припухлость лица, губ, языка или других частей тела
- зуд, или крапивница

**Не используйте Ипратропиум, раствор для ингаляций после истечения срока годности, напечатанного на упаковке, или если упаковка повреждена или имеет следы подделки.**

Если Вы не уверены, стоит ли начать применение лекарственного средства Ипратропиум, раствор для ингаляций, свяжитесь с Вашим доктором или фармацевтом.

*Перед началом применения*

**Сообщите Вашему доктору или фармацевту, если у Вас есть аллергия к каким-либо лекарственным средствам, пищевым продуктам, консервантам или красителям.**

**Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы беременны или собираетесь забеременеть.**

Ваш доктор или фармацевт проанализирует все возможные риски и преимущества применения Ипратропиума, раствора для ингаляций при применении во время беременности.

**Сообщите Вашему доктору или фармацевту, если Вы кормите грудью или планируете кормить.**

Ваш доктор или фармацевт проанализирует все возможные риски и преимущества применения Ипратропиума, раствора для ингаляций при применении во время кормления грудью.

**Сообщите Вашему доктору или фармацевту, если у Вас есть какие-либо из следующих медицинских состояний:**

- глаукома (высокое давление в глазах)
- затруднения или боль при мочеиспускании
- запор
- кистозный фиброз
- очень чувствительные дыхательные пути

**Если Вы не сообщили Вашему врачу или фармацевту об этом заранее, сообщите перед началом применения Ипратропиума, раствора для ингаляций**

*Применение других лекарственных средств*

**Сообщите Вашему доктору, если Вы принимаете какие-либо лекарственные средства, включая отпускаемые без рецепта врача.**



Некоторые лекарственные средства и Ипратропиум, раствор для ингаляций могут взаимодействовать друг с другом. Они включают:

- лекарственные средства, используемые для лечения сердечных заболеваний, например, адреналин
- лекарственные средства, используемые для лечения астмы или легочных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), например, теофиллин, сальбутамол или тиотропиум
- другие растворы для небулайзера, такие как династрия кромогликолят, который содержит консервант бензалкония хлорид.

Это из-за того, что некоторые растворы для небулайзера могут не смешиваться хорошо с Ипратропиум, раствором для ингаляций и могут требовать отдельных ингаляций.

Эти лекарственные средства могут воздействовать на Ипратропиум, раствор для ингаляций или могут оказывать влияние на то, как он работает. Вам может потребоваться принимать различные количества лекарственных средств, или Вам потребуется принимать различные лекарственные средства.

Ваш врач может предписать принимать Ипратропиум, раствор для ингаляций совместно с другими лекарственными средствами, которые расслабляют дыхательные пути для дополнительного облегчения симптомов заболеваний.

Проконсультируйтесь с Вашим доктором или фармацевтом перед смешиванием с другими растворами для ингаляций. Некоторые растворы для ингаляций могут не смешиваться с Ипратропиумом, раствором для ингаляций или должны ингалироваться отдельно.

У Вашего доктора или фармацевта есть больше знаний и информации о том, как правильно применять Ипратропиум раствор для ингаляций.

#### **4. КАК ПРИМЕНЯТЬ ИПРАТРОПИУМ, РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ.**

**Следуйте указаниям Вашего доктора или фармацевта.**

Они могут отличаться от информации, содержащейся в листке-вкладыше.

**Ипратропиум, раствор для ингаляций предназначен для ингаляций с помощью соответствующего небулайзера и не должен проглатываться.**

**Разбавленные растворы должны быть свежеприготовленными перед применением.**

**По окончании ингаляции, остатки раствора из чаши небулайзера следует уничтожить.**

**Ипратропиум, раствор для ингаляций не следует применять, если флакон открыт более 6 месяцев.**



По окончании этого периода, новый флакон Ипратропиума, раствора для ингаляций следует использовать.

Следуйте инструкциям ниже для правильного применения Ипратропиума, раствора для ингаляций, и, если у Вас есть какие-либо проблемы, проконсультируйтесь с Вашим доктором или фармацевтом.

1. Подготовьте Ваш небулайзер согласно инструкциям производителя или советам Вашего врача.
2. Поместите прописанное количество капель в чашу небулайзера.  
Дозатор на крышке флакона дозирует 1 мл Ипратропиума, раствора для ингаляций в 24 каплях. 1 мл Ипратропиума, раствора для ингаляций содержит 250 микрограмм ипратропия бромид (безводного).  
После дозирования раствора, плотно закройте флакон пластиковой крышкой.
3. Если необходимо разбавление, используйте 0,9% раствор натрия хлорида или следуйте рекомендациям лечащего врача.
4. Собирайте небулайзер или используйте его по указаниям врача.
5. После ингаляции следуйте инструкциям производителя для очистки небулайзера.

Если Вы не уверены, как правильно использовать маску для небулайзера, или Вы не понимаете инструкции на коробке, проконсультируйтесь с доктором или фармацевтом.

Детям следует использовать Ипратропиум, раствор для ингаляций по назначению врача и с помощью взрослых.


Наденьте маску небулайзера на нос и рот Вашего ребенка перед ингаляцией ЛС Ипратропиум, раствора для ингаляций, чтобы предотвратить попадание капель препарата в глаза.

Если препарат попал в глаза, немедленно промойте их проточной водой в течение нескольких минут.

Если у Вас трудности с вдыханием препарата или использованием маски для небулайзера одновременно, поговорите с Вашим доктором или фармацевтом. Возможно, они Вам порекомендуют другой метод.

*В каких количествах применять*

Обычные дозы для взрослых и детей указаны ниже.



## **Взрослые:**

От 1 до 2 мл лекарственного средства разбавляют до 2-3 мл 0,9% раствором натрия хлорида и распыляют (небулизируют) до тех пор, пока весь объем раствора не будет ингалирован, по 4 раза ежедневно.

## **Дети:**

1 мл разбавляют до 2-3 мл 0,9% раствором натрия хлорида и распыляют (небулизируют) до тех пор, пока весь объем раствора не будет ингалирован, по 4 раза ежедневно.

В зависимости от Вашего состояния и особых потребностей, Ваш доктор может назначить другие дозы.

### *Когда применять*

**Если Ваш доктор назначил применять Ипратропиум, раствор для ингаляций регулярно, применяйте лекарственное средство в одно и то же время ежедневно.**

Применяя в одно и то же время ежедневно, Вы достигнете максимального эффекта. Это также поможет Вам запомнить, когда его нужно использовать.

### *Если Вы забудете принять лекарственное средство*

**Если уже пришло время для приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу и просто примите следующую дозу по графику.**

**В иных случаях примите лекарственное средство сразу после того, как Вы вспомните о необходимости приема, а затем продолжите применение лекарственного средства по графику.**

**Не удваивайте дозу, чтобы восполнить пропущенный прием.**

Это может увеличить шансы появления нежелательных реакций.

**Если Вы не уверены в том, как правильно поступить, обратитесь к Вашему доктору или фармацевту**


### *Как долго применять лекарственное средство*

**Продолжайте применять лекарственное средство Ипратропиум, раствор для ингаляций так долго, как рекомендует Ваш врач.**

Ипратропиум, раствор для ингаляций помогает контролировать Ваше состояние, но не лечит его. Важно продолжать использовать лекарственное средство, даже если Вы себя хорошо чувствуете.

### *Если Вы приняли слишком много (передозировка)*

**Немедленно позвоните Вашему врачу или фармацевту, или в отделение скорой помощи, если Вы использовали Ипратропиум, раствор для ингаляций в слишком больших количествах, даже если у Вас нет признаков дискомфорта или отравления.**



Вам может понадобиться неотложная медицинская помощь.

Симптомы передозировки могут включать:

- Быстрое или нерегулярное сердцебиение
- Сухость во рту
- Размытое зрение

## **5. НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА.**

*Что Вы должны делать*

**Прекратите прием лекарственного средства и сообщите лечащему врачу незамедлительно, если у Вас появилась внезапная тяжесть в груди, кашель, одышка или хрип сразу после применения препарата Ипратропиум, раствор для ингаляций.**

Данные симптомы могут быть признаком бронхоспазма.

**В случае если у вас есть рекомендации по лечению астмы, назначенные Вашим лечащим врачом, следуйте им максимально близко.**

**Если Вы определили, что ежедневная доза Ипратропиума, раствора для ингаляций не вызывает состояния облегчения, как ранее, или Вы вынуждены применять лекарственное средство чаще, чем ранее, сообщите Вашему доктору об изменениях в состоянии.**

Важно удостовериться, что Ваши проблемы с дыханием контролируются надлежащим образом.

**Продолжайте применение Ипратропиума, раствора для ингаляций, в течение периода, рекомендованного врачом.**

**Придерживайтесь всех рекомендаций врача.**

**Немедленно сообщите врачу, если Ваше дыхание внезапно стало более трудным после применения лекарственного средства**

Это может быть признаком аллергической реакции.

**Немедленно обратитесь к врачу, если вы испытываете раздражение или чувствуете что-то в глазах, или у вас неполадки со зрением (размытое зрение, ареолы или окрашенные картинки) вместе с покраснением, при или после применения препарата.**

Все это может быть признаком серьезного нежелательного эффекта - краугольной глаукомы. Это также может случиться при попадании лекарственного средства в глаза.



**Сообщайте Вашим лечащим врачам, стоматологам и фармацевтам, что Вы проходите курс лечения с применением Ипратропиума, раствора для ингаляций.**

**Если Вам назначают новое лекарственное средство, сообщите Вашему доктору и врачу, что Вы принимаете Ипратропиум, раствор для ингаляций.**

**Если у Вас запланирована операция, сообщите врачу или анестезиологу, что Вы применяете Ипратропиум, раствор для ингаляций.**

Он может оказывать влияние на другие лекарственные средства.

**Если Вы забеременели во время применения Ипратропиума, немедленно сообщите врачу.**

*Что не следует делать*

**Не принимайте другие лекарственные средства для лечения проблем с дыханием без согласования с лечащим врачом.**

**Не передавайте лекарственное средство кому-либо еще, даже если у него такое же состояние как у Вас.**

**Не используйте Ипратропиум, раствор для ингаляций для лечения каких-либо других жалоб без назначения врача.**

**Не прекращайте прием лекарственного средства, не снижайте дозу без согласования с врачом.**

**Не допускайте попадание лекарственного средства в глаза**

*Следует быть осторожным*

**Будьте осторожны при работе с механизмами до тех пор, пока не узнаете, как Ипратропиум, раствор для ингаляций влияет на Вас**

Лекарственное средство может вызвать головокружение, нечеткое зрение у некоторых людей. Если у вас имеются подобные симптомы, не работайте с механизмами и не водите автомобиль. Детям следует быть осторожными при выполнении физических упражнений.

## **6. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

**Сообщите Вашему доктору или фармацевту как можно быстрее, если у Вас ухудшается самочувствие после приема лекарственного средства Ипратропиум, раствор для ингаляций.**

Лекарственное средство помогает людям при лечении астмы и хронической обструктивной болезни легких, но может вызывать нежелательные явления у некоторых людей. У всех лекарственных средств бывают нежелательные эффекты. Иногда они бывают серьезными, но в большинстве случаев нет. Следует прекратить применение лекарственного средства при возникновении нежелательных эффектов.



**Вам не следует тревожиться из-за перечня нежелательных эффектов, у Вас могут появиться только некоторые из них.**

Попросите доктора или фармацевта ответить на возникшие у Вас вопросы.

**Если у Вас появились нежелательные эффекты, не прекращайте прием лекарственного средства без консультации с лечащим врачом.**

**Сообщите врачу или фармацевту, если Вы заметили следующие нежелательные явления:**

- головная боль
- головокружение
- сухость или першение в горле
- раздражение горла
- кашель
- тошнота, рвота
- изменение перистальтики в желудке, например, запор, диарея, повышенное газообразование, рефлюкс (необычный обратный поток жидкости).

Это наиболее частые нежелательные эффекты Ипратропиума, раствора для ингаляций. Они легкой степени тяжести и быстротечные.

**Сообщите Вашему врачу, если у Вас проблемы с мочеиспусканием. Это серьезное нежелательное явление и может потребовать внимания.**

**Если что-либо из вышеописанного произошло, обратитесь в скорую помощь или ближайшую поликлинику:**

- трудности с дыханием или ухудшение имеющихся дыхательных проблем
- опухание горла
- ускоренное или нерегулярное сердцебиение
- удары в сердце
- аллергические реакции (нехватка дыхания, хрипы или трудности с дыханием; опухание лица, губ, языка и других частей тела, сыпь, икота или крапивница)
- жжение или чувство чего-то постороннего в глазу, покраснение глаз, расширение зрачков, размытое зрение, ареолы или окрашенные картинки.

Вышеприведенный перечень включает серьезные нежелательные явления. Они могут потребовать незамедлительного внимания или госпитализации.

<b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
--

## 7. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

### *Хранение*

Лекарственное средство необходимо хранить при температуре ниже 25°C. Уничтожайте остатки лекарственного средства через 6 месяцев после вскрытия.

Не храните Ипратропиум, раствор для ингаляций в ванной комнате или возле раковины.

Не оставляйте в машине или на подоконнике в жаркие дни.

Нагревание и влажность могут привести к порче лекарственного средства.

Храните лекарственное средство вдали от детей.

## 8. ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИПРАТРОПИУМ, РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ

### **Форма выпуска**

Раствор для ингаляций 0,25 мг/мл. По 20 мл лекарственного средства во флаконах из темного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками с контролем первого вскрытия. По 1 флакону с листком-вкладышем в картонной пачке.

### **Состав:**

1 мл Ипратропиума, раствора для ингаляций содержит 0,250 мг ипратропия бромиды (в виде ипратропия бромиды моногидрата – 0,261 мг) в качестве активного вещества.

Также содержит:

- Натрия хлорид
- Бензалкония хлорид
- Динатрия эдетат
- Хлористоводородную кислоту
- Воду очищенную

Ипратропиум, раствор для ингаляций не содержит лактозу, сахарозу, глютен, тартразин или какие-либо другие азокрасители.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.


### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.





**Предприятие-производитель**

ООО «Фортива Мед»

Республика Беларусь, 223012, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул.

Аэродромная, д. 4-2, каб. 21.

Тел. +375 17 301 91 45; +375 17 504 62 87.