


1804Б-2018

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
(ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)****Сертазол 300 мг, суппозитории вагинальные**
Действующее вещество: сертаконазола нитрат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Сертазол и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Сертазол.
3. Прием препарата Сертазол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Сертазол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СЕРТАЗОЛ
И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Вагинальные суппозитории Сертазол содержат в своем составе сертаконазол, который действует на грибки рода кандиды.

Сертазол применяется для местного лечения вагинальных грибковых инфекций (кандидоза) у взрослых.

Обнаружение грибка в вагинальном мазке, но без характерных симптомов (ощущение жжения, зуда во влагалище, выделения из влагалища), само по себе не является показанием к применению препарата.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА
СЕРТАЗОЛ**

Не применяйте препарат Сертазол

- если у вас аллергия на сертаконазол или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у вас аллергия к любому противогрибковому соединению группы имидазола;
- если вы одновременно используете презервативы и диафрагмы из латекса (вагинальный суппозиторий может повредить их);

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Сертазол проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Местное лечение – это только часть лечения. При подтверждении диагноза кандидоз важно выявить и устранить бытовые и гигиенические факторы, способствующие развитию и сохранению инфекции. Чтобы избежать рецидива, ликвидация возбудителя и установление вышеупомянутых бытовых и гигиенических факторов являются необходимыми. Рекомендуется использовать хлопчатобумажное белье вместо синтетического, избегать интенсивной гигиены влагалища и т. п.

Для местной гигиены используйте мыло с нейтральным рН (мыло с кислым рН способствует размножению грибка).

Если у вас возникла местная непереносимость или аллергия лечение должно быть прекращено.

Если установлено, что у вас имеются другие инфекции, ассоциированные с кандидозом, необходимо провести их лечение

Другие препараты и препарат Сертазол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе, препараты, отпускаемые без рецепта.

Суппозитории Сертазол могут снизить эффективность местных спермицидных контрацептивов, поэтому их совместное применение не рекомендуется.

Препарат Сертазол с пищей, напитками и алкоголем

Не взаимодействует.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата Сертазол проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Достаточных данных о применении сертаконазола при беременности и в период кормления грудью нет. Применение сертаконазола во время беременности и в период кормления грудью возможно в том случае, если предполагаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Сертазол не влияет на способность управлять транспортным средством или работать с механизмами.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА СЕРТАЗОЛ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Один вагинальный суппозиторий вводят один раз глубоко во влагалище перед сном.

Путь и способ введения

Перед применением препарата Сертазол необходимо обмыть наружные половые органы, используя мыло с нейтральным рН. Введите вагинальный суппозиторий глубоко во влагалище, желательнее в положении лежа. Самый простой способ - лечь на спину, согнув и разведя колени.

При одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков следует в период проведения лечения суппозиторием дополнительно применять на область наружных половых органов и перианальную область противогрибковый крем.


Необходимость одновременного лечения полового партнера определяется в индивидуальном порядке, при этом надо обратиться к Вашему лечащему врачу.

Менструация не является противопоказанием к применению лекарственного препарата Сертазол.

Дети и подростки

Препарат не показан к применению у детей.

Продолжительность терапии



Продолжительность лечения составляет один день.

В случае сохранения клинических симптомов возможно повторное применение лекарственного препарата Сертазол через 7 дней.

Если вы применили большее количество препарата Сертазол, чем следовало

Применяйте Сертазол в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

При вагинальном применении передозировка практически невозможна.

Если вы забыли применить Сертазол

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Сертазол может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции;
- жжение, зуд во влагалище (проходят самостоятельно, не требуют отмены лекарственного препарата)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» <http://www.rceth.by> или по электронному адресу rcpl@rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕРТАЗОЛ

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Сертазол содержит:

Действующим веществом препарата является сертаконазола нитрат.

Один суппозиторий содержит: 300 мг сертаконазола нитрат.

Вспомогательными веществами являются: кремния диоксид коллоидный безводный, жир твердый.


Внешний вид препарата Сертазол и содержимое упаковки

Суппозитории вагинальные яйцевидной формы, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие воронкообразного углубления.

1 суппозиторий в контурной ячейковой упаковке из полимерных материалов ПВХ/ПЭ.

Одна контурная ячейковая упаковка в пачке картонной с инструкцией по применению.

Условия отпуска из аптек:



НД РБ

1804Б-2018

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен:

06/2024

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь