1981 - 2017

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАРСИЛ® 22,5 мг таблетки, покрытые оболочкой
CARSIL® 22,5 mg coated tablets
силимарин (silymarin)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «21» 01 2020 № 53

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.
Данный лекарственный препарат отпускают без рецепта. Однако, для получения наилучших результатов лечения Вам следует тщательно соблюдать инструкции по применению лекарственного препарата.
- Сохраните данный листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Вам следует обратиться к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение.
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заметите другие, неописанные в данном листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

В данном листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Карсил и для чего используется
2. Перед приемом Карсил
3. Как принимать Карсил
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Карсил
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАРСИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Карсил – лекарственный препарат, который содержит активное вещество силимарин, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой. Силимарин активирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных клетках печени, стабилизирует их клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие). Его основное действие заключается в защите клеток печени от вредных воздействий различных факторов, таких как алкоголь, лекарства, вирусные инфекции, промышленные загрязнители. При поражениях клеток печени он способствует их более быстрому восстановлению.
Используется для симптоматического лечения хронических токсических поражений печени, для поддерживающего лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени и с циррозом печени.

2. ПЕРЕД ПРИЕМОМ КАРСИЛ

Не принимайте Карсил
- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или любому из вспомогательных веществ Карсил;

1981 - 2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- детям младше 12 лет из-за отсутствия достаточного клинического опыта применения у детей.

Обратите особое внимание при применении Карсил

- лечение Карсил не может заменить диету или воздержание от употребления алкоголя при печеночных поражениях;
- из-за возможного эстрогеноподобного действия применение у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичников и матки, карцинома предстательной железы) должно происходить после консультации со специалистом.

Прием других лекарственных препаратов

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая отпускаемые без рецепта.
Карсил может уменьшить эффективность пероральных противозачаточных средств и лекарственных препаратов, которые используются при заместительном гормональном лечении.
Может усилить действие таких лекарственных препаратов, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед применением любого лекарства во время беременности и в период грудного вскармливания. Карсил можно принимать только по медицинским показаниям, если польза от лечения превышает риск применения препарата для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

Карсил не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с машинами.

Важная информация о некоторых компонентах Карсил

- Лекарственный препарат содержит пшеничный крахмал. Карсил не представляет риска для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не должны принимать это лекарство.
- Лекарственный препарат содержит в качестве вспомогательных веществ лактозу моногидрат и сахарозу. Если у Вас имеется непереносимость некоторых сахаров, посоветуйтесь с Вашим врачом перед применением данного лекарственного препарата.
- В состав оболочки входят метилпарагидроксибензоат (Е218) и пропилпарагидроксибензоат (Е216). Они могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

3. КАК ПРИНИМАТЬ КАРСИЛ

Таблетки принимают целиком, запивая достаточным количеством жидкости.

В отсутствие других указаний, взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по 6 таблеток 3 раза в сутки.

Дети:

Нет достаточных данных об эффективности и безопасности силимарина у детей, поэтому Карсил не рекомендуется принимать детям младше 12 лет.

НЦ РБ
1981 - 2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Если Ваши жалобы сохраняются, обратитесь за советом к Вашему врачу.
Продолжительность курса лечения устанавливается лечащим врачом.

Если Вы приняли дозу Карсил, превышающую необходимую
Если Вы приняли дозу, превышающую назначенную, обратитесь за советом к своему лечащему врачу.

Если Вы пропустили прием Карсил
Если Вы пропустили одну дозу, примите ее как можно скорее. Если почти наступило время для приема следующей дозы, примите ее как обычно. Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной. Продолжайте принимать лекарство по назначению.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные средства, Карсил может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они проявляются не у каждого.
Лекарственный препарат обладает хорошей переносимостью. Побочные действия являются переходящими и исчезают после прекращения приема лекарственного средства.

Некоторые нежелательные реакции могут быть серьезными.
Прекратите прием лекарственного препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас развилась аллергическая реакция, признаки которой могут включать зуд, сыпь, крапивницу, отек лица, губ, языка или горла, затруднения при дыхании, головокружение (данные симптомы могут быть связаны с развитием анафилактического шока).

Лекарственный препарат Карсил может вызывать следующие нежелательные реакции:

Очень редко (менее 1 на 10 000 пациентов) возможны кожные аллергические реакции, такие как зуд, сыпь, крапивница.

Редко (с вероятностью появления у 1 до 10 пациентов на 10 000) можно наблюдать усиление существующих вестибулярных нарушений. Возможно появление диареи.

С неизвестной частотой (на основании существующих данных невозможно сделать оценку частоты): появление тошноты, рвоты, уменьшение аппетита, диспептических нарушений с образованием газов.

Если какое-либо из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие побочные действия, неописанные в этом листке-вкладыше, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

5. КАК ХРАНИТЬ КАРСИЛ

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 (три) года.

1981 - 2017

Не принимайте Карсил после истечения срока годности, отмеченного на картонной упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как утилизировать ненужные Вам лекарства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержится в Карсил

Действующее вещество:

40,9 - 56,3 мг сухого экстракта плодов Расторопши пятнистой (35-50:1), эквивалентно 22,5 мг силимарина в форме силибинина (HPLC); (экстрагент – метанол).

Вспомогательные вещества:

Ядро таблетки: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, повидон, микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат, тальк, маннитол, кросповидон, полисорбат 80, натрия гидрокарбонат.

Покрывающая (дражировочная) оболочка: целлюлозы ацетат фталат, диэтилфталат, сахароза, акации камедь, желатин, тальк, титана диоксид (Е171), макрогол 6000, Опалюкс AS 26586 коричневый (сахароза, очищенная вода, железа оксид красный (Е172), железа оксид черный (Е172), метилпарагидроксибензоат (Е218), пропилпарагидроксибензоат (Е216)), глицерол.

Как выглядит Карсил и что содержится в упаковке

Таблетки, покрытые оболочкой, правильной круглой формы, коричневого цвета.

10 таблеток, покрытых оболочкой, упаковывают в блистер из твердой, бесцветной, прозрачной ПВХ пленки и алюминиевой фольги.

8 блистеров (80 таблеток, покрытых оболочкой) вместе с листком-вкладышем для потребителя помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптечной сети: без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель:

АО СОФАРМА
ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего одобрения листка-вкладыша: Май, 2019