

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

**Климадинон®**

**Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы**

**Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

**Состав**

1 таблетка содержит:

2,8 мг сухого экстракта корневища цимицифуги «BNO 1055» (*Cimicifugae racemosae*) (5-10:1)  
(экстрагирующий растворитель: этанола 58 % по объему).

*Вспомогательные ингредиенты:* лактоза моногидрат, кальция гидрофосфат дигидрат, картофельный крахмал, магния стеарат, тальк, титана диоксид (E 171), железа оксид красный (E 172), железа оксид желтый (E 172), макрогол 6000, эудрагид RL 30 D.

**Описание**

Круглые таблетки двояковыпуклой формы терракотового (светло-коричневого) цвета с гладкой поверхностью.

**Производитель:**

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Телефон: +49 (0) 9181 231-90

Факс: +49 (0) 9181 231-265

Интернет: [www.bionorica.de](http://www.bionorica.de)

Представительство в Республике Беларусь

220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А, пом. 25,

Тел.: +375 17 388 75 27, +375 17 388 75 28, +375 17 388 75 29

e-mail: [office@bionorica.by](mailto:office@bionorica.by)

**Фармакотерапевтическая группа**

Другие гинекологические препараты. Цимицифуги корневища. Код АТС: G02СХ04

**Показания к применению**

Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы и повышенная потливость.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

**Предостережения и меры предосторожности**

Следует принимать Климадинон® с осторожностью

- пациенткам, имеющим в анамнезе заболевания печени, не следует принимать Климадинон® без предварительной консультации врача
- если у пациентки развиваются признаки и симптомы, указывающие на поражение печени (усталость, потеря аппетита, пожелтение кожи и глаз, сильные боли в верхней части живота, тошнота, рвота или темная моча), следует прекратить приём Климадинона® и немедленно обратиться к врачу
- при появлении нарушений цикла или повторных менструаций, а так же новых и неясных симптомов следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о заболевании, требующем медицинского вмешательства.
- пациенткам репродуктивного возраста на время приема следует позаботиться о контрацепции
- не следует принимать вместе с эстрогенами, если это не назначено врачом
- пациенткам, которые прошли или проходят лечение (курс лечения) против рака молочной железы или других гормонозависимых опухолей, не следует принимать Климадинон® без консультации у врача
- если наблюдается ухудшение симптоматики во время приема препарата, необходимо проконсультироваться с врачом
- в состав лекарственного средства входит лактоза. Пациенткам с наследственной непереносимостью сахаров не следует принимать данный препарат без консультации у врача.

*Примечание для больных сахарным диабетом:* разовая доза препарата (1 таблетка) содержит в среднем 0,01 «хлебных единиц» (ХЕ).

*Применение в педиатрической практике:* лекарственное средство не применяется у детей и подростков.

*Применение у пациенток с нарушением функции почек:* информация отсутствует.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**


Не известны

**Применение в период беременности и кормления грудью**

Исследования данного лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не проводились. Из-за отсутствия соответствующих исследований не рекомендуется применение препарата в период беременности и лактации.

**Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами**

Не известны.



**Способ применения и дозы**

Принимается внутрь. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день в одно и то же время суток (утром и вечером).

Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая и не рассасывая, запивая жидкостью.

Терапевтический эффект наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

Не следует принимать Климадинон® дольше 6 месяцев без консультации врача.

**Побочное действие**

Прием препаратов, содержащих цимицифугу, может сопровождаться печеночной токсичностью (включая гепатит, желтуху, изменение печеночных функциональных тестов). Частота не известна.

Возможно возникновение кожных реакций (например, крапивница, зуд, экзантема), отек лица, периферические отёки, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта (например, диспепсические расстройства, диарея). Частота не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка**

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

**Условия хранения и срок годности**

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

Срок годности указан на упаковке.

Не применять после окончания срока годности!

**Форма выпуска**

По 15 таблеток в блистер. По 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача

