

Листок-вкладыш – информация для пациента **НД РБ**
Стрептоцид, 100 мг/г, мазь для наружного применения
сульфаниламид

00905-2021

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.


Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Стрептоцид, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Стрептоцид.
3. Применение препарата Стрептоцид.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Стрептоцид.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СТРЕПТОЦИД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Стрептоцид - противомикробный препарат, сульфаниламид, который действует бактериостатически (подавляет способность микроорганизмов к росту и размножению).

Показания к применению

Лекарственный препарат Стрептоцид показан к применению у взрослых для лечения язв, ожогов, трещин, ран, пиодермий, рожистого воспаления и других патологических гнойно-воспалительных процессов кожи, которые сопровождаются присутствием микроорганизмов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СТРЕПТОЦИД

Не применяйте препарат Стрептоцид:

- если у Вас есть аллергия (гиперчувствительность) на сульфаниламид или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас анемия;
- если у Вас почечная и/или печеночная недостаточность;
- если у Вас врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- если у Вас в крови повышенное содержание продуктов азотистого обмена;
- если у Вас порфирия – нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если у Вас имеются нарушения функции почек, перед применением лекарственного препарата Стрептоцид необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Если Вы длительно применяете препарат Стрептоцид, предупредите об этом своего лечащего врача. Возможно, Вам потребуется контроль показателей крови и функции почек и печени.

При появлении аллергических реакций после применения препарата Стрептоцид, лечение необходимо прекратить.

Во время лечения препаратом Стрептоцид рекомендуется обильное щелочное питье.

Дети и подростки

Лекарственный препарат не рекомендовано применять детям до 18 лет.

Другие препараты и препарат Стрептоцид

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяли, недавно применили или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Не рекомендуется применение препарата Стрептоцид с препаратами, оказывающими токсическое действие на клетки миелоидной ткани костного мозга.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Беременность

Не существует контролируемых клинических исследований у беременных женщин, поэтому лекарственный препарат не должен применяться во время беременности.

Лактация

Нет данных о проникновении сульфаниламида в грудное молоко, поэтому лекарственный препарат не должен применяться в период лактации.

Фертильность

Данные о влиянии лекарственного препарата на фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Стрептоцид не оказывает влияние на управление автотранспортом и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТРЕПТОЦИД

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача и работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Мазь следует наносить тонким слоем, непосредственно на пораженную поверхность кожи.

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Если вы забыли применить препарат Стрептоцид

Продолжайте применение препарата, как рекомендовано. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.


Если Вы применили препарата Стрептоцид больше, чем следовало

При длительном применении больших доз возможно развитие нежелательных реакций, таких как головная боль, дискомфорт в животе, снижение уровня лейкоцитов и агранулоцитов в крови, тошнота, рвота, образование кристаллов в моче.

Лечение симптоматическое.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

00905-2021



4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат **Стрептоцид** может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата Стрептоцид возможно развитие аллергических реакций. При длительном применении больших доз возможно появление нежелательных реакций, таких как головная боль, дискомфорт в животе, снижение уровня лейкоцитов и агранулоцитов в крови, тошнота, рвота, образование кристаллов в моче.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТРЕПТОЦИД

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните лекарственный препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог его увидеть.

Срок годности: 5 лет.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Стрептоцид содержит:

Действующее вещество: сульфаниламид.

1 г мази содержит 0,1 г действующего вещества.

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый.

Внешний вид препарата Стрептоцид и содержимое упаковки

Мазь белого или светло-желтого цвета.

25 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Листок-вкладыш пересмотрен