

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**Витавирин, 90 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь**  
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
по заказу Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
23 ОКТ 2024 № 1386

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5 дней Вам следует обратиться к врачу.

#### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат Витавирин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Витавирин.
3. Прием препарата Витавирин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Витавирин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### **1. Что собой представляет препарат Витавирин, и для чего его применяют**

Препарат Витавирин содержит в качестве действующего вещества имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, который относится к противовирусным препаратам прямого действия.

Препарат Витавирин применяется у взрослых пациентов для лечения и профилактики гриппа А и В и других острых респираторных вирусных инфекций (аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

#### **2. О чем следует знать перед приемом препарата Витавирин**

##### **Не принимайте препарат Витавирин:**

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любой другой компонент препарата, перечисленный в разделе 6 листка-вкладыша;
- если Вы беременны и/или кормите грудью.

Препарат Витавирин противопоказан к применению у детей младше 18 лет.

##### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Витавирин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Витаваирин не оказывает седативного действия, не влияет на скорость психомоторной реакции и может использоваться у лиц различных профессий, в т.ч. требующих повышенного внимания и координации движений.

Не рекомендуется одновременный прием других противовирусных препаратов.

Препарат содержит маннит, который может оказать незначительное слабительное действие.

### **Дети**

Препарат Витаваирин не применяется у детей младше 18 лет.

### **Другие препараты и препарат Витаваирин**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Случаев взаимодействия с другими препаратами не выявлено.

### **Препарат Витаваирин с пищей, напитками и алкоголем**

Прием пищи не оказывает влияния на эффективность препарата Витаваирин.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат во время беременности.

Не кормите грудью во время лечения данным препаратом. Женщинам, принимающим препарат Витаваирин, следует прекратить грудное вскармливание.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось, однако, учитывая механизм действия и профиль нежелательных реакций, можно предположить, что препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## **3. Прием препарата Витаваирин**

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**


Для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: по одному пакету (90 мг) один раз в день.

Длительность лечения 5-7 дней (в зависимости от тяжести состояния).

Прием препарата следует начинать с момента появления первых симптомов заболевания, желательно не позднее 2 суток от начала болезни..

Для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций после контакта с больными лицами: по одному пакету (90 мг) один раз в день в течение 7 дней.

### **Путь и способ введения**



Внутрь, независимо от приема пищи.

Содержимое пакета растворите в стакане воды, перемешайте и выпейте как можно скорее. Приготовленный раствор представляет собой бесцветный или с желтоватым оттенком опалесцирующий раствор.

**Если Вы приняли препарата Витавирин больше, чем следовало**

Случаи передозировки не описаны, клинические симптомы передозировки неизвестны. Если Вы приняли больше одного пакета препарата в день, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**Если Вы забыли принять препарат Витавирин**

Примите препарат, как только вспомните, но не принимайте двойную дозу (два пакета), чтобы компенсировать пропущенную. Не принимайте более одного пакета препарата Витавирин в день.

**Если Вы прекратили прием препарата Витавирин**

Если Вы прекратите прием препарата слишком рано, симптомы заболевания могут возобновиться или усилиться. Препарат Витавирин следует принимать в течение рекомендованного периода.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Витавирин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

– аллергические реакции.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь


УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Тел/факс: +375 (17) 242 00 29

Адрес электронной почты: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: <https://www.rceth.by>



**5. Хранение препарата Витавирин**

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

Приготовленный раствор хранению не подлежит.

Храните препарат в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.  
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Витавирин содержит**

Действующим веществом является имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты.

Каждый пакет содержит 90 мг имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты.

Вспомогательными веществами являются: сукралоза, ароматизатор Лимон лайм (мальтодекстрин, гуммиарабик (E414), вкусоароматические вещества), маннит (E421).

### **Внешний вид препарата Витавирин и содержимое упаковки**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Порошок от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с запахом лимона, допускается наличие мягких комков.

По 3,0 г в пакеты из материала упаковочного многослойного (пленка полиэтилентерефталатная/пленка полипропиленовая/фольга алюминиевая/пленка полиэтиленовая). По 7 пакетов вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

**Условия отпуска:** без рецепта.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

ООО «АмантисМед»

Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская 2И

Тел/факс: (+375 1774) 25 286

Адрес электронной почты: [office@amantismed.by](mailto:office@amantismed.by)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:**

ООО «АмантисМед»

Адрес: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская 2И

Тел/факс: +375 (1774) 25 286

Адрес электронной почты: [office@amantismed.by](mailto:office@amantismed.by)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

