


НД РБ

8214 - 2015



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ФУРАЦИЛИН
(FURACILINUM)

Прочитайте внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат предназначен лично для Вас и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Торговое название препарата: Фурацилин.

Международное непатентованное название: нитрофурал.

Описание

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Состав

1 таблетка содержит:

Активное вещество:

Нитрофурал (фурацилин) - 0,02 г,

Вспомогательное вещество:

Натрия хлорид.

Лекарственная форма: таблетки для приготовления раствора для местного применения.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и дезинфицирующие средства. Производные нитрофурана.

Код АТХ: [D08AF01].

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III ст., мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Противопоказания

Гиперчувствительность, аллергодерматозы, кровотечение.

Способ применения и дозировка

Фурацилин применяют наружно, в виде водного 0,02 % раствора. Для приготовления водного раствора 1 таблетку растворить в 100 мл воды (для быстрого растворения использовать горячую или кипящую воду). После этого раствор охладить до комнатной температуры.

При гнойных ранах, пролежнях, язвенных поражениях, ожогах II и III степени орошают рану водным раствором Фурацилина и накладывают влажные повязки.

Полоскание рта и горла: 20 мг (1 таблетку) растворить в 100 мл воды.

Передозировка

При соблюдении рекомендованных способов применения случаи передозировки не известны.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, дерматиты, требующие временного перерыва или полного прекращения применения препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом Вашему врачу.

Меры предосторожности

В случае возникновения каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Применение в детской практике

Информация о применении препарата в детском возрасте отсутствует.

Применение у пожилых людей

Нет необходимости корректировать дозу в зависимости от возраста.

Применение у лиц с нарушенной функцией печени

Информация об опыте применения у лиц с нарушенной функцией печени отсутствует.

Применение у лиц с нарушенной функцией почек

Информация об опыте применения у лиц с нарушенной функцией почек отсутствует.

Влияние лекарственного средства на способность управлять автомобилем или механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

На данное время взаимодействие фурацилина с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Готовый раствор можно хранить в течение 14 дней в хорошо закупоренных банках из темного стекла, в прохладном (8-15 °С) и защищенном от света месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Срок годности

5 лет. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Форма выпуска

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 20 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1 контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.


НД РБ

8214 - 2015

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ОАО "Татхимфармпрепараты "
420091, Россия, г. Казань, ул. Беломорская, 260
тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38
E-mail: marketing@tatpharm.ru

Зам. генерального директора
по технологии
ОАО «Татхимфармпрепараты»



И.Р. Абдуллин