


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

**ОФТАН® КАТАХРОМ
(OFTAN® CATACHROM)**



Лекарственная форма. Капли глазные.

Состав:

1 мл лекарственного средства содержит:

действующее вещество: цитохром С 0,675 мг, аденозин 2 мг, никотинамид 20 мг;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0,04 мг, натрия сукцинат гексагидрат, сорбит, натрия фосфат двузамещенный 2-водный, натрия фосфат однозамещенный 2-водный, вода для инъекций.

Описание: прозрачный, красноватого цвета раствор.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения заболеваний глаз. Прочие средства для лечения заболеваний глаз.

Код АТС S01 ХА.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Механизм действия глазных капель Офтан® Катахром при лечении катаракты базируется главным образом на антиоксидантном и питательном действиях его активных ингредиентов, таких как цитохром С, аденозин, никотинамид.

Показания.

Начальная старческая катаракта.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Способ применения и дозы.

Закапывать по 1-2 капли местно в конъюнктивный мешок пораженного глаза (глаз), осторожно оттянув нижнее веко и глядя вверх, 3 раза в сутки.

Перед инстилляцией глазных капель:

- Тщательно вымойте руки
- Примите удобное положение (сядьте, лягте на спину, станьте перед зеркалом).


Применение глазных капель:

1. Откройте флакон. Во избежание загрязнения содержимого флакона – не прикасайтесь кончиком флакона к векам, ресницам и не трогайте его руками.




При первом использовании флакона, поверните крышку флакона с одновременным нажатием вниз и затем откройте флакон.


2. Запрокиньте голову назад. Поместите флакон над глазом.



3. Оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх и слегка сжимая флакон, закапайте глазные капли в глаз.



4. Закройте глаз, слегка прижмите его внутренний угол пальцем в течение 1 минуты. Это поможет Вам избежать попадания глазных капель в носослезный канал. Плотно закройте флакон.



Побочные реакции.

После закапывания может наблюдаться кратковременное жжение и пощипывание в глазах. Изредка сообщалось о симптомах аллергического конъюнктивита (конъюнктивальная гиперемия, зуд глаз, ощущения жжения в глазах) и контактного дерматита.

В редких случаях - аллергические реакции, сопровождающиеся сыпью на коже, зудом, гиперемией и отеком кожи лица могут быть вызваны лекарственным средством Офтан® Катахром.

Тем не менее, глазные побочные реакции наблюдаются крайне редко. Возможными кратковременными побочными реакциями, которые связаны с аденозином, являются: тошнота, артериальная гипотензия, головокружение и одышка.

Никотиновая кислота обладает сосудорасширяющим действием, и потому может вызывать приливы, ощущения жара, обморок и ощущение пульсации в голове.

Не сообщалось о системных побочных реакциях, вызванных цитохромом С.

Из-за малого содержания в глазных каплях активных веществ системные побочные эффекты маловероятны.

Передозировка.

Офтан® Катахром в указанных дозах является безопасным для офтальмологического применения благодаря незначительному всасыванию в кровь и быстрому распаду в крови. Случаи случайной или преднамеренной пероральной передозировки неизвестны. В случае передозировки необходимо провести симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не выявлено клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами.

Применение у детей.


Лекарственное средство не рекомендуется использовать у детей в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности.

Особенности применения.

Офтан® Катахром не применяется для инъекций или перорального приема.

Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид в качестве консерванта, который может абсорбироваться на мягких контактных линзах. Следует снять контактные линзы перед

2425 - 2018



закапыванием капель и одеть их вновь через 15 минут после применения средства.

В случае одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств больному следует подождать 15 минут между закапываниями.

Во избежание загрязнения капельницы и раствора, не рекомендуется касаться ресниц и других участков поверхности кончиком капельницы. Флакон следует хранить плотно закрытым.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В связи с недостаточностью клинических данных лекарственное средство не рекомендуется применять в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

После инстилляций лекарственного средства может возникнуть кратковременное затуманивание зрения, потому не следует управлять автотранспортом или другими механизмами, пока зрение полностью не восстановится.

Форма выпуска.

По 10 мл во флакон-капельницу из полиэтилена низкой плотности с навинчивающейся крышкой из полиэтилена высокой плотности. Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

Срок годности. 3 года.

Использовать в течение 1 месяца после открытия флакона.

Условия хранения.

Хранить при температуре +8 - +15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Сантен АО, Ниитгихаанкату 20, 33720 Тампере, Финляндия.