

НД РБ

4394 - 2020



Листок-вкладыш
информация для пациентов
Доктор Тайсс Эхинацея Форте

Лекарственная форма

Раствор для приема внутрь.

Состав:

50 мл раствора содержат:

Действующее вещество:

отжатый сок травы эхинацеи
пурпурной (*Echinacea purpurea* (L.) Moench)
(DER 1,5 – 2,5 : 1)

37,8 мл

вспомогательное вещество:

Этанол 96% (по объему)

12,2 мл

1 мл капле для приема внутрь (20 капле) содержит: 0,756 мл отжатого сока травы эхинацеи пурпурной.

Описание

мутная красновато-коричневая или зеленовато-коричневая жидкость с характерным запахом и вкусом

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях. Код АТС - R05X

Механизм действия неизвестен.

Показания к применению

Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.


Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства астровых (сложноцветных).

Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т.ч. туберкулез, саркоидоз, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция или СПИД, злокачественные заболевания, патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.), состояние иммунодефицита или иммуносупрессии. 4394 - 2020
Детский возраст (до 12 лет). Беременность и период лактации.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.



Дозировка и способ применения

Если не предписано иначе, взрослым и детям старше 12 лет принимать по 55 капель (что составляет 2,75 мл) 3-4 раза в день.

Капли можно принимать неразбавленными или растворенными в воде комнатной температуры. Лекарственное средство рекомендуется запивать водой. Прием лекарственного средства может осуществляться независимо от приема пищи.

Для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний лекарственное средство не следует использовать более 10 дней. При лечении острых респираторных заболеваний прием лекарственного средства следует начинать при первых признаках заболевания.

Побочное действие

Возможно развитие реакций повышенной чувствительности (кожная сыпь, зуд, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек, снижение артериального давления, бронхоспазм с обструкцией, анафилактический шок). Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией. Возможно развитие желудочно-кишечных нарушений (тошнота, рвота, диарея).

Были сообщения о связи приема препаратов эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный энцефалит, узловатая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев). При приеме более 8 недель может развиваться лейкопения.

В случае появления указанных реакций или возникновении других симптомов, не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.


Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки возможно развитие или усиление симптомов, описанных в разделе "Побочное действие".

При случайном приеме большого количества лекарственного средства ребенком, немедленно обратитесь к врачу. Возможно развитие тяжелого отравления этиловым спиртом, которое у детей младшего возраста может привести к летальному исходу.

Лечение симптоматическое

4394 - 2020

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

- Не рекомендуется одновременный прием с иммунодепрессантами. Возможно изменение фармакологических эффектов лекарственных средств, метаболизирующихся с участием цитохрома P450.
- Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:
 - лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризеофульвин, производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин.
 - лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.
 - необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.
- Перед совместным приемом с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Лекарственный препарат Имуно Тайсс содержит 23 об.% этанола, то есть 0,5 г этанола (этилового спирта) на разовую дозу (55 капель), что равно 12,7 мл пива, 5,3 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. Содержание этилового спирта необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям старше 12 лет, пациентам с заболеваниями печени, органическими заболеваниями головного мозга и эпилепсией.

Если во время приема лекарственного средства симптомы не улучшаются или происходит ухудшение состояния (появляется кашель с гнойной мокротой, развиваются нарушения дыхания, повышается температура), необходимо обратиться к врачу.

При часто повторяющихся инфекциях дыхательных путей необходимо проконсультироваться с врачом.

Существует риск анафилактических реакций у пациентов с атопией, данным пациентам перед использованием препаратов эхинацеи необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства не рекомендуется детям до 12 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных данных применение препаратов эхинацеи не рекомендуется беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт (23 об.% этанола).
Во время приема лекарственного средства не рекомендовано управлять
автотранспортом и работать с механическим оборудованием.

Форма выпуска

Флаконы коричневого стекла 50 мл с капельницей из полиэтилена,
завинчивающиеся винтовой крышкой с защитным кольцом и без него. Флакон
вместе с инструкцией по применению помещен в картонную коробку.



Срок годности

3 года. Открытый флакон хранить не более 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытом флаконе при температуре не выше +25 °С, в картонной упаковке с целью защиты от света, недоступном для детей месте.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ
Мишелинштрассе 10,
66424 Хомбург, Германия

Представительство в Республике Беларусь

ИООО «Натусана»
Республика Беларусь
220140, г. Минск, ул. Лещинского, д. 8/4-1
Тел./факс: +375 17 399 69 65