


НД РБ

7667 - 2020

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ



Перед приемом препарата ПОЛДАНЕН полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается, или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу

ПОЛДАНЕН

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Круглые, двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета, на изломе неоднородные бело-серые, с темными вкраплениями, со специфическим запахом, характерным для экстракта коры сливы африканской.

СОСТАВ

1 таблетка содержит 46,0 мг экстракта коры сливы африканской (*Prunus Africana* Hook f.Kalkm., cortex) (DER 200:1, экстрагент - метиленхлорид), что соответствует содержанию 6 мг β -ситостерола.

Вспомогательные вещества: ядро таблетки: кальция фосфат, крахмал картофельный, сахароза, стеарат магния, тальк; оболочка таблетки: гипромеллоза, макрогол 6000, оранжевый желтый лак Е 110, титана диоксид Е 171.

ФОРМА ВЫПУСКА: 2 блистера по 15 таблеток в картонной пачке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Познаньский завод лекарственных трав „Гербапол” А.О.
ул. Товарова 47/51, 61-896 Познань

Содержание Листка-вкладыша:


1. Что представляет собой препарат Полданен и для чего применяется
2. Что необходимо знать перед применением препарата Полданен
3. Как применять препарат Полданен
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения препарата Полданен
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Прочая информация

POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL S.A.



(3)

61-896 POZNAŃ, ul. Towarowa 47/51



1. Что представляет собой препарат Полданен и для чего применяется

Полданен является лекарственным препаратом, содержащим экстракт коры сливы африканской. Применяется у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (простаты) на ранних стадиях заболевания в качестве симптоматического средства при таких нарушениях как частое мочеиспускание, необходимость частого мочеиспускания ночью, затрудненное мочеиспускание. Полданен используется только у взрослых мужчин.

2. Что необходимо знать перед применением препарата Полданен

Диагноз гиперплазии предстательной железы должен поставить уролог (симптомы гиперплазии предстательной железы могут быть сходны с симптомами новообразования этого органа). Применение препарата не освобождает пациента от регулярных консультаций с врачом. Препарат не влияет на размер предстательной железы, он только облегчает симптомы, связанные с ее гиперплазией. В случае если симптомы усиливаются или сохраняются, если в моче обнаружится кровь или возникнет острая задержка мочи, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Не следует применять лекарственный препарат:

- при повышенной чувствительности к активному или вспомогательным веществам, содержащимся в препарате, или к растениям семейства розоцветных (*Rosaceae*);
- у пациентов с диагностированным новообразованием предстательной железы.

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот лекарственный препарат.

Препарат содержит также краситель Е 110, который может вызвать аллергические реакции.

Применение у лиц с заболеваниями печени, почек

Данные по применению препарата у пациентов с нарушением функции печени, почек отсутствуют.

POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL S.A.

Применение у детей

Препарат нельзя применять детям.



(3)

61-896 POZNAŃ, ul. Towarowa 47/51

Беременность или кормление грудью

Препарат не предназначен для лечения женщин. Безопасность применения экстракта коры сливы африканской в период беременности и кормления грудью не установлена. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами


Применение лекарственного препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и обслуживать механические устройства.

Применение других лекарственных препаратов

Необходимо сообщить врачу о всех применяемых в последнее время лекарственных препаратах, даже тех, которые отпускаются без рецепта. До настоящего времени не выявлено взаимодействий с другими лекарственными препаратами.

3. Как применять препарат Полданен

Если врач не назначит иначе, лекарственный препарат применяют 2 раза в день по 1-2 таблетки во время еды, в течение как минимум 4 недель. При необходимости курс лечения можно повторить.

**В случае применения препарата Полданен в дозе большей, чем назначено**

Препарат имеет широкий диапазон терапевтических доз. Отсутствуют сообщения о случаях передозировки.

В случае пропуска приема дозы лекарственного препарата Полданен

Можно вернуться к предыдущей схеме дозирования. Не следует применять двойную дозу для компенсации пропущенной.

4. Возможные побочные действия

Как любой препарат, Полданен может вызывать побочные действия.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, запор, диарея, боли в желудке. Возможны аллергические реакции, головокружение, нарушение зрения. Препарат может оказывать влияние на метаболизм андрогенов и эстрогенов.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного средства.

5. Условия хранения препарата Полданен

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не следует применять препарат Полданен по истечении срока годности, указанного на упаковке.

6. Срок годности

3 года

7. Условия отпуска из аптек

Без рецепта

8. Прочая информация

Для получения более подробной информации, необходимо обратиться к производителю:

Польша

Познаньский завод лекарственных трав „Гербапол” А.О.

ул. Товарова 47/51, 61-896 Познань

тел.: +48 61 886 18 00; факс: + 48 61 853 60 58

POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL S.A.



(3)

61-896 POZNAŃ, ul. Towarowa 47/51