


ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша  
Листок-вкладыш  
Информация для потребителей



## ПИКОВИТ® КИДС

**Торговое название препарата:** Пиковит® Кидс (Pikovit® Kids).

**Форма выпуска:** Таблетки, покрытые оболочкой.

### Общая характеристика

#### Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, красного, желтого, зеленого и оранжевого цвета.

**Состав** 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Витамин А пальмитат (1,7 млн. МЕ/г)	600 МЕ (0,35 мг)
Холекальциферол (1 млн. МЕ/г) (витамин D <sub>3</sub> )	80 МЕ (0,08 мг)
Аскорбиновая кислота (витамин С)	10,00 мг
Тиамин мононитрат (витамин В <sub>1</sub> )	0,25 мг
Рибофлавин (витамин В <sub>2</sub> )	0,30 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В <sub>6</sub> )	0,30 мг
Цианокобаламин 0,1% в манните (E421) (витамин В <sub>12</sub> )	0,20 мг
Никотинамид	3,00 мг
Фолиевая кислота	0,04 мг
Кальция пантотенат	1,20 мг
Двухосновный кальция фосфат (безводный)	43,00 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза моногидрат, апельсиновое масло, полисорбат 80, глицерин, касторовое масло очищенное, лимонная кислота безводная, сорбит, глюкоза жидкая, противопенный агент, магния стеарат, капол 600 фарма, парафин жидкий, повидон, сахароза, краситель Пунцовый 4R (E124), титана диоксид (E171), краситель апельсиновый желтый (E110), краситель хинолиновый желтый (E104), краситель индигодин (E132).

**Фармакотерапевтическая группа** Поливитамины в комбинации с минеральными веществами.

Код АТХ: А11АА02

**Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для вас информацию.**

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

Препарат можно принимать без назначения врача. Тем не менее, вы должны принимать Пиковит Кидс в соответствии с рекомендациями по применению для получения наилучшего результата.

- Сохраните этот листок вкладыш. Возможно, он вам потребуется вновь.
- Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Вы должны обратиться к врачу в случае ухудшения вашего состояния, или в случае если симптомы вашего состояния не улучшаются в течение 30 дней.
- Если у вас возникли побочные эффекты, или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данном документе, сообщите об этом своему врачу.

**В этом листке-вкладыше:**

1. Что такое Пиковит Кидс и для чего он используется.
2. Что вы должны знать перед применением Пиковит Кидс.
3. Как принимать Пиковит Кидс.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Условия хранения Пиковит Кидс.
6. Дополнительная информация.

**1. Что такое Пиковит Кидс и для чего он используется**

Таблетки, покрытые оболочкой, Пиковит Кидс содержат десять витаминов в сочетании с минералами: кальцием и фосфором.

Витамины и минералы являются важными факторами метаболических процессов в организме, необходимы для нормального роста и развития, для поддержания и укрепления здоровья.

Витамины группы В (В1, В2, В6, пантотеновая кислота и никотинамид) принимают участие в метаболизме углеводов, жиров и белков, а также в функционировании нервной системы. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D играет важную роль в поддержании баланса кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С повышает всасывание железа и участвует во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Кальций и фосфор играют ключевую роль в минерализации костей и зубов.

Пиковит Кидс таблетки, покрытые оболочкой, отличаются только внешним видом (разные по цвету) и имеют одинаковый состав.

Таблетки, покрытые оболочкой, Пиковит Кидс применяются для восполнения повышенной потребности организма в витаминах, кальции и фосфоре, компенсируют дефицит этих веществ в рационе, когда общие меры (разнообразное и регулярное питание) не является достаточным.

Пиковит Кидс таблетки, покрытые оболочкой, имеют очень приятный вкус и в основном предназначены для детей:

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

- при отсутствии аппетита;
- при переутомлении;
- в комплексной терапии в качестве вспомогательных веществ при приеме антибиотиков;
- в качестве витаминно-минеральной добавки при несбалансированном и неполноценном питании.

Пиковит Кидс таблетки, покрытые оболочкой, не являются заменой сбалансированного и разнообразного питания. Поэтому важно, чтобы питание вашего ребенка было сбалансированное и разнообразное даже во время применения Пиковит Кидс, таблеток покрытых оболочкой.

## **2. Что вы должны знать перед применением Пиковит Кидс**

### **Не принимайте Пиковит Кидс**

- если у вас аллергия (повышенная чувствительность) к активным веществам или любым другим ингредиентам Пиковит Кидс.
- если у вас гипервитаминоз А или D, гиперкальциемия.

Пиковит Кидс не рекомендуются детям до 4-х лет.

### **Соблюдайте особую осторожность при приеме Пиковит Кидс**

- если вы страдаете сахарным диабетом, вы можете принимать Пиковит Кидс, но должны иметь в виду, что суточная доза содержит от 2,4 до 4,2 г сахара. Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит 0,6 г сахара.
- если у вас есть заболевания печени, острое воспаление почек, сердечная декомпенсация, желчекаменная болезнь, хронический панкреатит, аллергические заболевания, идиосинкразия, новообразования.

Перед совместным применением с другими витаминами, витаминно-минеральными и/или минеральными препаратами проконсультируйтесь с врачом.

### **При приеме других лекарственных средств**


Пожалуйста, расскажите врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе лекарственные средства, полученные без рецепта.

Пиковит Кидс содержит кальций, который задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков группы тетрациклинов и антимиикробные средства из группы фторхинолонов. Также входящий в состав рибофлавин препятствует абсорбции и снижает эффективность антибиотиков. Поэтому интервал между приемом Пиковит Кидс и антибиотиков/антимиикробных средств должен составлять 2-3 часа.

Пиридоксин снижает эффективность леводопы, если пациент принимает только леводопу.

Во избежание передозировки жирорастворимых витаминов не рекомендуется принимать Пиковит Кидс совместно с другими витаминами или витаминно-минеральными комплексами.

5513 - 20



ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

### **Беременность и кормление грудью**

Перед применением каких-либо лекарственных средств проконсультируйтесь с врачом.

Беременные женщины и кормящие матери должны принимать витамины и минералы по назначению врача. Дозы витаминов в таблетках, покрытых оболочкой, Пиковит Кидс адаптированы для детей.

### **Вождение автомобиля и управление механизмами**

О влиянии препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не сообщалось.

Пиковит Кидс не влияет на моторную функцию детей.

Важная информация о некоторых из вспомогательных веществ Пиковит Кидс.

Пиковит Кидс содержит лактозу, сахарозу, глюкозу, сорбит и азокрасители.

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Азокрасители E110, E124 могут вызвать аллергические реакции.

### **3. Как принимать Пиковит Кидс**

Всегда принимайте Пиковит Кидс так, как назначил ваш доктор. Если вы не уверены, свяжитесь со своим врачом.

Обычная доза для детей от 4 до 6 лет составляет ежедневно по 1 таблетке, 4 раза в сутки, максимально – 5 раз в сутки. Прием таблеток осуществляется под контролем взрослых. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 таблетке 5 раз в сутки. Максимум – 7 таблеток в сутки (по рекомендации врача).

Дети должны держать таблетку во рту до полного рассасывания. При нарушении аппетита Пиковит Кидс принимается в течение 2 месяцев, в других случаях должен приниматься периодически по необходимости.

### **Если вы приняли больше таблеток Пиковит Кидс, чем следовало.**

При приеме в рекомендованных дозах интоксикация не предполагается.

Длительное применение очень больших доз может привести к гипервитаминозу А и D, хотя риск развития передозировки при приеме Пиковит Кидс минимален. При кратковременном использовании больших доз витамина А симптомы гипервитаминоза могут проявляться в виде болей в животе, анорексии, рвоты, помутнения зрения, головной боли, несогласованных движений и покраснения кожи. Длительное применение больших доз витамина А может вызвать истончение и зуд кожи, потрескавшиеся губы, конъюнктивит, нарушение зрения, боль в суставах, головная боль, рвота.

ПИКОВИТ КИДС текст листка - вкладыша

При передозировке витамина D могут развиваться анорексия, потеря веса, утомляемость, дезориентация, рвота, диарея или запор, металлический привкус, сухость во рту и повышенная жажда.

#### **Если вы забыли принять Пиковит Кидс**

Не принимайте двойную дозу, если вы забыли принять таблетки.

Если у вас возникли вопросы по использованию данного лекарственного средства, спросите у вашего доктора или фармацевта.

#### **4. Побочное действие**

Как и все лекарственные средства Пиковит Кидс может вызывать побочные эффекты

- очень редкие (<1/10000);

*Нарушения со стороны иммунной системы*

- очень редкие: реакции гиперчувствительности.

При развитии реакций повышенной чувствительности прием препарата необходимо прекратить и обратиться к вашему врачу.

Если у вас возникли побочные эффекты, или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данном документе, сообщите об этом своему врачу.

#### **Упаковка**

Картонная коробка с 30 таблетками (2 блистера по 15 таблеток) вместе с листком-вкладышем.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света и влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек** Без рецепта врача.

#### **Производитель**

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.