



**Примафунгин**

суппозитории вагинальные 100 мг

– Перед использованием лекарственного средства Примафунгин вы должны проконсультироваться с врачом.

– Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.

– Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).

– Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.

– Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

– Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.

– Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

**Торговое название**

Примафунгин

**Международное непатентованное название (МНН)**

Natamycin

**Общая характеристика**

Суппозитории цилиндрической формы, от желтого до светло-желтого цвета или желтого цвета с бежевым оттенком. Допускается глянцевая и/или матовая поверхность суппозитория, наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

**Состав**

1 суппозиторий содержит:

*активное вещество:* натамицин 100 мг.

*вспомогательные вещества:* цетиловый спирт, сорбитан триолеат, полисорбат-80, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота, твердый жир.

**Форма выпуска**

Суппозитории вагинальные

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами). Натамицин.

Код АТХ: G01AA02.

**Показания к применению**

- вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом грибами Candida.

Если Вам требуется дополнительная информация о Вашем состоянии, обратитесь за советом к своему врачу.

**Способ применения и дозы**

*Применение данного лекарственного средства возможно только после консультации с врачом!*

*Не прекращайте прием Примафунгин без предварительной консультации с лечащим врачом!*

*Если у Вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу.*

Интравагинально.

Применяют взрослым женщинам по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозитории рекомендуется как можно глубже вводить во влагалище (в положении лежа) 1 раз в сутки (на ночь).

В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии нужно завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания.

**Нежелательные реакции**

*Местные реакции* – легкое раздражение слизистой, ощущение жжения.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

**Передозировка**

При применении суппозитория вагинального практически исключается системное воздействие, так как препарат не всасывается через слизистую оболочку.

**Меры предосторожности**

В период менструации терапию суппозиториями прерывают. В период лечения суппозиториями нет необходимости в исключении половых контактов. Однако рекомендуется провести обследование половых партнёров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения партнера. Также следует предусмотреть использование в период лечения барьерных контрацептивов.

Цетиловый спирт, который входит в состав вагинальных суппозиториях, может вызвать чувство легкого жжения в генитальной области при повышенной чувствительности к данному компоненту.

*Применение у пациентов с нарушенной функцией печени и почек*

Примафунгин действует местно. Системная абсорбция действующего вещества практически отсутствует, поэтому при нарушении функции печени и почек, у пациента не требуется изменение режима дозирования.

*Применение препарата у детей*

Натамицин в этой лекарственной форме не применяют детям.

*Применение в гериатрической практике*

Применение препарата возможно в любом возрасте по стандартной схеме.

**Беременность и лактация**

Возможно применение препарата Примафунгин в период беременности и лактации.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Применение препарата не влияет на способность к вождению и управлению потенциально опасными механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

*Если в настоящее время или в недавнем прошлом Вы принимали другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу.*

Лекарственное взаимодействие препарата Примафунгин не описано.

Вещества, обладающие окислительными свойствами, такие как пероксиды, перманганат, йод, гипохлориты и т.д., могут инактивировать натамицин.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °С.  
Не замораживать.

НД РБ

6989 - 2019

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту врача.

**Упаковка**

Суппозитории вагинальные, содержащие 100 мг натамицина, по 3 штуки в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки. По 1 контурной ячейковой упаковке № 3 вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

**Информация о производителе**

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

тел.: (+373-22)-28-18-45, тел./факс: (+373-22)-28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

