


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ**Торговое название**

Примафунгин

**Международное непатентованное название (МНН)**

Natamycin

Общая характеристика

Суппозитории цилиндрической формы, от желтого до светло-желтого цвета или желтого цвета с бежевым оттенком. Допускается глянцевая и/или матовая поверхность суппозитория, наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

Состав

1 суппозиторий содержит:

активное вещество: натамицин 100 мг.

вспомогательные вещества: цетиловый спирт, сорбитан триолеат, полисорбат-80, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота, твердый жир.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами). Натамицин.

Код АТХ: G01AA02.

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. Активен в отношении большинства патогенных дрожжеподобных грибов (особенно *Candida albicans*), дерматофитов (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*), дрожжей (*Torulopsis*, *Rhodotorula*), других патогенных грибов (*Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Cephalosporium*), а также в отношении некоторых простейших (трихомонад). Не влияет на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Фармакокинетика

Не оказывает системного действия, так как практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек.

Вагинальные суппозитории под действием температуры тела расплавляются, образуя объемно распространяющуюся пенистую массу, что способствует равномерному распределению активной субстанции по слизистой оболочке.

НД РБ

Показания к применению

6989 - 2019

- вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом грибами *Candida*.

Способ применения и дозы

Интравагинально.

Применяют взрослым женщинам по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозитории рекомендуются как можно глубже вводить во влагалище (в положении лежа) 1 раз в сутки (на ночь).

В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии нужно завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания.

Нежелательные реакции

Местные реакции – легкое раздражение слизистой, ощущение жжения.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

При применении суппозитория вагинального практически исключается системное воздействие, так как препарат не всасывается через слизистую оболочку.

Меры предосторожности

В период менструации терапию суппозиториями прерывают. В период лечения суппозиториями нет необходимости в исключении половых контактов. Однако рекомендуется провести обследование половых партнёров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения партнера. Также следует предусмотреть использование в период лечения барьерных контрацептивов.

Цетиловый спирт, который входит в состав вагинальных суппозиториях, может вызвать чувство легкого жжения в генитальной области при повышенной чувствительности к данному компоненту.


Применение у пациентов с нарушенной функцией печени и почек

Примафунгин действует местно. Системная абсорбция действующего вещества практически отсутствует, поэтому при нарушении функции печени и почек, у пациента не требуется изменение режима дозирования.

Применение препарата у детей

Натамицин в этой лекарственной форме не применяют детям.

Применение в гериатрической практике



Применение препарата возможно в любом возрасте по стандартной схеме. **НД РБ**

Беременность и лактация

6989 - 2019

Возможно применение препарата Примафунгин в период беременности и лактации.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Применение препарата не влияет на способность к вождению и управлению потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата Примафунгин не описано.

Вещества, обладающие окислительными свойствами, такие как пероксиды, перманганат, йод, гипохлориты и т.д., могут инактивировать натамицин.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °С.

Не замораживать.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Упаковка

Суппозитории вагинальные, содержащие 100 мг натамицина, по 3 штуки в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки. По 1 контурной ячейковой упаковке № 3 вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Информация о производителе

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

тел.: (+373-22)-28-18-45, тел./факс: (+373-22)-28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

