

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
Малыш



Торговое название лекарственного средства: Малыш.

Международное непатентованное название: Нет.

Описание. Белый или серовато-белый, мягкий, жирный на ощупь порошок. При растирании между ладонями не должно ощущаться крупинок, комочков.

Состав на 40 г порошка:

Действующее вещество: цинка оксид – 4 г.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 4 г, тальк – 32 г.

Форма выпуска: Порошок для наружного применения по 40 г.

Фармакотерапевтическая группа: Дерматологические средства. Средства со смягчающим и защитным действием. Средства на основе цинка.

Код АТХ: [D02AB].

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Цинка оксид оказывает адсорбирующее, подсушивающее и вяжущее действие. Лекарственное средство в целом уменьшает экссудацию и мокнутие, снимает и предупреждает раздражение и воспаление кожных покровов.

Фармакокинетика

Информация отсутствует.

Показания к применению

Используется в качестве детской присыпки.

«Пелёночная сыпь», дерматиты.

Способ применения и дозы

Применяют наружно, нанося непосредственно на поражённые участки кожи при необходимости до трёх раз в день.

Для профилактики опрелостей у детей лекарственное средство наносят на участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельём. При дерматитах – наносят тонким слоем с помощью ватного тампона на поражённые участки кожи.

Если в процессе лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

При повышенной чувствительности к лекарственному средству возможны зуд, гиперемия, сыпь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, острые гнойно-воспалительные заболевания кожи, мокнущие участки поражённой кожи.

Передозировка

Не описана.

7545 - 2020

Меры предосторожности

Только для наружного применения. Храните лекарственное средство в недоступном для детей месте.

Лекарственное средство не применяют при инфицированных повреждениях и гнойничковых заболеваниях кожи. Не допускать попадания лекарственного средства в глаза и на поверхность ран.

Применение в период беременности или в период лактации

Информация о безопасности препарата при применении во время беременности и в период лактации отсутствует. Влияние на беременность не ожидается, поскольку системная экспозиция цинка оксида при наружном применении маловероятна, лекарственное средство можно применять в период беременности и/или лактации.

Применение у детей

Применяют.

Влияние на способность к управлению транспортом и другими потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.


Условия хранения и срок годности

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

Упаковка

По 40 г в банки из полиэтилена, укупоренные крышками из полиэтилена.

Текст инструкции по медицинскому применению наносится на этикетку банки.

120 банок помещают в коробку из картона.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Открытое Акционерное Общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»).

Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7

Тел./факс: (3522) 48-16-89

E-mail: contact@ksintez.ru

Интернет-сайт: www.ksintez.ru