


НД РБ

7616 - 2020



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

### КАМЕФЛЮ, аэрозоль для местного применения

*Перед использованием лекарственного средства КАМЕФЛЮ Вы должны проконсультироваться с врачом.*

*Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*

*Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).*

*Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*

*Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

*Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.*

*Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

#### **Название лекарственного средства.**

Камефлю.

#### **Форма выпуска.**

Аэрозоль для местного применения.

#### **Краткая характеристика готовой лекарственной формы.**

КАМЕФЛЮ представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

#### **Состав лекарственного средства.**

##### **Один баллон содержит:**

*Действующие вещества:* хлорбутанола гемигидрат – 0,1 г, камфора рацемическая – 0,1 г, левоментол – 0,1 г.

*Вспомогательные вещества:* масло эвкалиптовое, изопропилмирикат, хладон 134а.

#### **Фармакотерапевтическая группа.**

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.


Код АТС – R02A A20.

#### **Показания к применению.**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.

**Информация о правильном применении.****Противопоказания.**

- возраст до 18 лет;
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата;
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в полости носа и рта.

**Информация об особенностях применения.**

Перед применением Камефлю ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой. Перед применением препарата в полости носа следует очистить нос от слизи.

Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, предохранять от ударов.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

*Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.*

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

**Дети.**

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей не рекомендовано.

**Влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.**

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

**Применение у лиц пожилого возраста.**

Нет данных об особенностях применения препарата у данной категории пациентов.


**Способ применения и дозы.**

При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 5-14 дней.

Перед применением снять защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Если у Вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу.



### **Передозировка.**

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного действия.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

### **Побочные реакции.**

Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта).

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

### **Условия хранения и срок годности.**

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействия солнечных лучей.

Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

### **Упаковка.**

По 30 г в баллонах аэрозольных алюминиевых с клапанами дозирующего действия. Каждый баллон с распылительной насадкой, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### **Информация о производителе (заявителе).**

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,  
телефон: +38 (057) 714-24-22.