


ИНСТРУКЦИЯ

НЦ РБ 8001 - 2016

по медицинскому применению лекарственного препарата

(листок-вкладыш)

**ДЕПАНТОЛ®**



- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

**Торговое название препарата:** Депантол®

**Форма выпуска:** крем для наружного применения

**Международное непатентованное название:** Хлоргексидин, комбинации

**Состав**

1 г крема содержит:

*действующие вещества:* декспантенол – 52,5 мг, хлоргексидина биглюконат (в виде хлоргексидина биглюконата раствора 20 %) – 8,02 мг;

*вспомогательные вещества:* пропиленгликоль - 100 мг, макрогола цетостеарат - 16 мг, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %] - 54 мг, парафин жидкий - 100 мг, вазелин - 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат – 0,2 мг, калия дигидрофосфат – 7,8 мг, вода - до 1 г.

**Описание**

Крем белого или почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и дезинфицирующие средства

**Код АТХ:** D08AC52

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Комбинированный препарат. Декспантенол - витамин группы В. В организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, глюкокортикостероидов, порфиринов; стимулирует

регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее и метаболическое действие. Хлоргексидин - противомикробный препарат, является антисептическим средством. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.* Хлоргексидин умеренно активен в отношении микобактерий, дерматофитов и грибов. Неэффективен в отношении спор бактерий и грибов.

Крем Депантол® защищает поверхность раны от инфекций, подавляет течение инфекционного процесса и ускоряет заживление.

#### *Фармакокинетика*

Декспантенол быстро абсорбируется через поврежденную кожу. В клетках кожи декспантенол метаболизируется в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота выводится в неизменном виде с мочой и калом.

Хлоргексидин практически не всасывается при наружном применении.

#### **Показания к применению**

Поверхностные повреждения кожи, при которых существует риск инфицирования: царапины, порезы, ссадины, трещины кожи.


#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к хлоргексидину, декспантенолу и/или другим компонентам препарата; глубокие, кровоточащие или мокнущие раны.

Крем Депантол® нельзя наносить на перфорированную барабанную перепонку; не следует использовать под окклюзионную повязку при трофических язвах нижних конечностей.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно. Применяется у взрослых и детей согласно показаниям. Крем наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи 2 раза в сутки. Курс лечения кремом Депантол® определяется индивидуально, в зависимости от исходного состояния (степени повреждения кожи) и динамики заживления, и, как правило, составляет 1 – 2 недели.





был выявлен повышенный риск развития кожных реакций у недоношенных новорожденных, в особенности рожденных до 32 недель беременности, у которых хлоргексидин применялся в течение первых двух недель жизни.

#### *Применение в период беременности или кормления грудью*

Клинических данных по применению декспантенола и хлоргексидина женщинами в период беременности нет. Эксперименты на животных не позволяют сделать прямых или косвенных выводов о вредном воздействии декспантенола и хлоргексидина на течение беременности, развитие эмбриона/зародыша, роды или послеродовое восстановление.

Во время беременности препарат не следует наносить на большие поверхности.

Клинических данных по применению декспантенола и хлоргексидина в период лактации и о проникновении компонентов препарата в грудное молоко нет.

Кормящие матери не должны наносить крем Депантол® на большие поверхности в области груди.

#### *Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами*

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами, работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами.

Не рекомендуется применять крем Депантол® одновременно с другими антисептическими средствами.

#### **Упаковка**


Крем для наружного применения.

30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.



**Срок годности**

2 года.

Не применять препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

**АО «НИЖФАРМ», Россия**

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)

